

Título: ALOPECIA DIFUSA EFLUVIO TELOGENICO CRONICO: CRITERIOS CLINICOS, TRICOLOGICOS
E HISTOLOGICOS DIFERENCIADORES ENTRE EFLUVIO TELOGENICO CRONICO Y
ALOPECIA ANDROGENETICA FEMENINA
Autor: ROSILLO GALINDO MONTSERRAT
Universidad: GRANADA
Departamento: MEDICINA
Fecha de lectura: 26/07/2001

Direccion:

GUTIERREZ SALMERON M. TERESA (director)
LINARES SOLANO JUAN (codirector)

Tribunal:

HERRERA CEBALLOS ENRIQUE (presidente)
BOSCH GARCIA RICARDO (vocal)
SANCHEZ CONEJO MIR JULIAN (vocal)
ORTEGA DEL OLMO ROSA M^a (vocal)

Descriptor:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
GINECOLOGIA

Resumen:

Desde siempre la alopecia ha constituido una de las consultas mas frecuentes en Medicina. La alopecia constituye actualmente un problema de gran trascendencia desde un punto de vista medico y social, tanto por su elevada prevalencia como por las posibles repercusiones personales y familiares que conlleva.

Cuando un paciente acude a la consulta por caida de cabello que considera anormal, nos esta explicando una serie de sintomas y signos que merecen ser estudiados y valorados clinicamente con sumo cuidado porque pueden ser el comienzo de una enfermedad local o general, o incluso acompañarse de alteraciones psicologicas.

Este estudio se ha centrado en la investigacion de alopecias femeninas concretamente en las dos causas mas frecuentes de alopecias difusas, cronicas, alopecias debidas a Efluvios(anagenicos y telogenicos) y Alopecia Androgenetica Femenina; planteandose el diagnostico diferencial entre Efluvio Telogenico Cronico(ETC) y Alopecia Androgenetica Femenina(FAGA).

El ETC consiste en una aceleracion del paso de los folículos en anagen a telogen con la consiguiente caida de cabellos a los 2-4 meses. Kligman fue el primero que introdujo el concepto de Efluvio Telogenico, observando que el aumento de la perdida de pelo telogénico normal podria ser debido a una aceleracion del ciclo capilar.

Actualmente siguen vigentes los 5 tipos funcionales de Efluvio Telogénico que Headington(1993) describio:

Recambio Anagenino Inmediato. Recambio Anagenico Tardio. Anagen Corta.

Recambio Telogénico Inmediato. Recambio Telogenico Tardio.

ETC se manifiesta en mujeres de mediana edad, entre la 4ª y 6ª década de la vida que refieren elevada cantidad y densidad de pelo previo al comienzo de la caída (Whiting DA, 1996) la cual suele ser brusca y general, y afecta a todo el cuero cabelludo. Esta caída puede durar desde 6 meses hasta varios años. El curso suele ser fluctuante acompañándose de un adelgazamiento difuso capilar generalizado