GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: ANALISIS DE LAS INFECCIONES FUNGICAS DE AFECTACION CUTANEA Y SUPERFICIAL.

Autor: MAESTRE VERA JUAN RAMON
Universidad: AUTÓNOMA DE MADRID

Fecha de lectura: 01/01/1995

Direccion:

GARCIA CABALLERO JUAN (director)

Tribunal:

DEL REY CALERO JUAN (presidente)
PICAZO DE LA GARZA JUAN (vocal)
FERNANDEZ VALENCIA RAFAEL (vocal)
PEÑA YAÑEZ JULIAN (vocal)
CASADO JIMENEZ MARIANO (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
MEDICINA PREVENTIVA

Resumen:

LAS MICOSIS CUTANEAS Y SUPERFICIALES, REPRESENTAN UN VERDADERO PROBLEMA DE SALUD PUBLICA, SON DE PRESENTACION COMUN EN POBLACION GENERAL, HABIENDOSE COMPARADO CON LA CARIES DENTAL Y EL RESFRIADO COMUN EN CUANTO A INCIDENCIA Y PREVALENCIA. SIGUEN SIENDO LAS INFECCIONES FUNGICAS MAS FRECUENTES E IMPORTANTES EN TERMINOS DE MORBILIDAD.

DIFIEREN EN CUANTO A SU DISTRIBUCION GEOGRAFICA, FORMAS CLINICAS DE PRESENTACION, AGENTES ETIOLOGICOS, FUENTES DE CONTAGIO, VIAS DE TRANSMISION, INCIDENCIA POR EDAD, SEXO, ETC.

EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO ES LLEVAR A CABO UN ANALISIS DE ESTAS VARIABLES; MEDIANTE UN ESTUDIO RETROSPECTIVO REALIZADO A PARTIR DE 5.035 MUESTRAS CLINICAS, DURANTE UN PERIODO DE ONCE AÑOS (1982-92), EN LAS AREAS SANITARIAS DE MADRID - HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO SAN CARLOS - Y EL FERROL - HOSPITAL NAVAL.

LOS RESULTADOS MAS DESTACADOS SON: RESPECTO A LAS DERMATOFITOSIS O TIÑAS, LA INCIDENCIA ANUAL MEDIA EN EL FERROL FUE 2.27 VECES MAS ALTA QUE EN MADRID (9.1 VERSUS 4 CASOS POR 10.000 HABITANTES). LOS VARONES SE VIERON MAS AFECTADOS (RATIO VARONES/MUJERES: 1.35). EL AGENTE ETIOLOGICO MAS FRECUENTE FUE T.MENTAGROPHYTES. TINEA CORPORIS FUE LA FORMA CLINICA DE PRESENTACION MAS COMUN.

EN EL HOSPITAL MILITAR DE FERROL, TINEA CRURIS FUE MAS

PREVALENTE. EXISTE UNA ASOCIACION ENTRE LOS VARONES Y LAS TIÑAS POR HONGOS ANTROPOFILICOS DEL TIPO E.FLOCCOSUM Y, LAS MUJERES Y LAS TIÑAS POR HONGOS ZOOFILICOS DEL TIPO M.CANIS.

EN EL AREA SANITARIA DE DE MADRID, PREVALENCIERON LAS ESPECIES T. MENTAGROPHYTES, SEGUIDA POR M. CANIS Y E.

FLOCCOSUM. EN EL AREA DEL FERROL, PREDOMINARON LAS ESPECIES E.FLOCCOSUM, T.MENTAGROPHYTES Y T.RUBRUM.

LAS ESPECIES ZOOFILICAS, EN CONJUNTO, FUERON LAS MAS FRECUENTES. EN EL FERROL, LAS ESPECIES ANTROPOFILICAS SUPERARON EN NUMERO DE AISLAMIENTOS A LAS ZOOFILICAS. POR REGRESION LOGISTICA SE ESTABLECIO ASOCIACION ENTRE POBLACION MILITAR Y DERMATOFITOSIS. EL HOMBRE CONSTITUYO LA MAYOR FUENTE POTENCIAL