GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA URTICARIA CRONICA

Autor: HARTO CASTAÑO ANTONIO
Universidad: AUTÓNOMA DE MADRID

Fecha de lectura: 01/01/1987

Tribunal:

GARCIA PEREZ ANTONIO	(presidente)
ROBLEDO AGUILAR ANTONIO	(vocal)
GUERRA TAPIA AURORA	(vocal)
SIMON MERCHAN ANGEL	(vocal)
GARCIA DIEZ AMARO	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA

Resumen:

SE REALIZO DURANTE UN PERIODO DE 10 AÑOS UN ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO Y ETIOPATOGENICO EN 300 ENFERMOS AFECTOS DE URTICARIA CRONICA (U.C.). SE CONCLUYE QUE EL 53 % CORRESPONDEN A FORMAS IDIOPATICAS; EL 23 % A URTICARIAS FISICAS Y ENPROPORCIONES ALGO MENORES LAS FORMAS DEFINIDAS COMO PSICOGENA ATOPICA. OTRAS ETIOLOGIAS HALLADAS COMO LA INFECCIOSA PARANEOPLASICA NO SUPERAN EL 6 %.

UN GRUPO DE 18 ENFERMOS FUERON ANALIZADOS PSIQUIATRICAMENTE DETECTANDOSE ALTERACIONES DE LA PERSONALIDAD EN EL 38 8 Y PSIQUIATRICAS EN EL 44 4 %.

SE ESTUDIARON LAS ALTERACIONES HISTOPATOLOGICAS PRESENTES EN LA U.C COMPROBANDOSE LA ESCASA AFECTACION VASCULAR EN DICHO PROCESO. NO EXISTE UN PATRON CARACTERISTICO DE INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA.

UTILIZANDO ANTICUERPOS MONOCLONALES E INMUNOPEROXIDASA INDIRECTA SE CARACTERIZO EL INFILTRADO CELULAR INFLAMATORIO PRESENTE EN DICHAS LESIONES OBSERVANDOSE UN PREDOMINIO DE MONOCITOS/MACROFAGOS (OKM1) LINFOCITOS T (PAN T) Y CELULAS DE LANGERHANS (OKT 6).

CON ESTUDIOS DOBLES CIEGO CONTROLADOS SE PUDO COMPROBAR LA EFICACIA TERAPEUTICA DE LA DOXEPINA MEQUITACINA TERFENADINA Y EBASTINE (LAS W-090).