GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Título: APORTACION AL ESTUDIO DE LA INMUNIDAD HUMORAL Y CELULAR EN DISTINTAS FASES CLINICAS DEL ECZEMA ALERGICO POR CONTACTO.

Autor: TORRES MURILLO M. PILAR

Universidad: CÓRDOBA

Fecha de lectura: 01/01/1989

Tribunal:

SANCHEZ GUIJO PEDRO	(presidente)
MENDEZ GARCIA LEONCIO	(vocal)
GAY MARTINEZ FRESNEDA CARLOS	(vocal)
CONDE HERNANDEZ JOSE	(vocal)
SOLANA RAFAEL	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS DE LA VIDA
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
HIPERSENSIBILIDAD
INMUNOLOGIA

Resumen:

ANTE LA FRECUENCIA, CADA VEZ MAYOR, DEL ECZEMA ALERGICO POR CONTACTO (E.A.C) EN NUESTRO MEDIO, Y ANTE LA CONTROVERSIA ACTUALMENTE EXISTENTE SOBRE LOS DISTINTOS ASPECTOS INMUNOLOGICOS QUE INTERVIENEN EN SU PRODUCCION.

NOS HEMOS PLANTEADO REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES INMUNOLOGICAS QUE EN EL SE PRODUCEN.

CON ESTE OBJETIVO HEMOS SELECCIONADO UN GRUPO DE PACIENTES AFECTOS DE E.A.C., AL QUE HEMOS ESTUDIADO COINCIDIENDO CON UN BROTE DE LESIONES ACTIVAS, MOMENTO QUE HEMOS DENOMINADO FASE AGUDA. LUEGO TRAS LA CURACION CLINICA, FASE INTERCRISIS. POR ULTIMO CUANDO DE NUEVO PRESENTABA LESIONES, POR REEXPOSICION AL ALERGENO O ALERGENOS RESPONSABLES, A LO QUE LLAMAMOS BROTE AGUDO. EN CADA UNA DE LAS FASES SE HAN LLEVADO A CABO LAS SIGUIENTES DETERMINACIONES: POBLACIONES LINFOCITARIAS EN SANGRE PERIFERICA, NIVELES SANGUINEOS DE LAS DISTINTAS INMUNOGLOBULINAS, TEST CUTANEOS DE HIPERSENSIBILIDAD Y SENSIBILIZACION ACTIVA AL DNCB.

HEMOS SELECCIONADO UN GRUPO DE SUJETOS SANOS, EN LOS QUE HEMOS REALIZADO LAS MISMAS DETERMINACIONES ANTES CITADAS.

CON ELLO
HEMOS ENCONTRADO UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LOS NIVELES SANGUINEOS DE IGE, SIN ALTERACION DE LOS NIVELES DE IGG, IGA E IGM, EN LAS TRES FASES ESTUDIADAS. ASI COMO UN DESCENSO SIGNIFICATIVO DE LOS CD4 Y CD8 EN SANGRE PERIFERICA, EN LA FASE AGUDA DEL ECZEMA ALERGICO POR CONTACTO.

OBTENEMOS UNA
DISMINUCION DE LA REACTIVIDAD, TRAS LA APLICACION DE LOS TEST CUTANEOS DE HIPERSENSIBILIDAD CELULAR, ASI COMO FRENTE A LA SENSIBILIZACION ACTIVA AL DNCB, EN LA FASE INTERCRISIS DEL ECZEMA ALERGICO POR CONTACTO.