

Título: ASOCIACION LIQUEN RUBER PLANO Y HEPATOPATIA CRONICA.

Autor: ALPERA BADENES PURIFICACION

Universidad: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

Fecha de lectura: 01/01/1996

Direccion:

RODRIGO GOMEZ JOSE MANUEL (director)

Tribunal:

CALAP CALATAYUD JOAQUIN (presidente)

CORTINA GREVI PEDRO (vocal)

JORDA CUEVAS ESPERANZ (vocal)

PEREZ MATEO REGADERA MANUEL (vocal)

SERRA DESFILIS MIGUEL ANGEL (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS

CIENCIAS MEDICAS

DERMATOLOGIA

GASTROENTEROLOGIA

MEDICINA INTERNA

Resumen:

SE ESTUDIA EN ENFERMOS CON LIQUEN PLANO RUBER LA EXISTENCIA DE PATOLOGIA HEPATICA Y ENFERMOS CON ENFERMEDAD HEPATICA CRONICA LA EXISTENCIA DE LIQUEN RUBER PLANO. DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE OBSERVA UNA PREVALENCIA ELEVADA DE ENFERMEDAD HEPATICA EN LOS ENFERMOS CON LIQUEN RUBER PLANO, SIENDO ESTA MAS FRECUENTE EN LAS LOCALIZACIONES EN MUCOSA DE LA LESION.

EN LOS ENFERMOS CON ENFERMEDAD HEPATICA SE DEMUESTRA UNA PREVALENCIA DE LESIONES TIPO LIQUEN DEL 3.8%. SE ANALIZAN LAS CARACTERISTICAS DEL LIQUEN ASOCIADO A LA ENFERMEDAD HEPATICA PARA LO QUE SE REALIZA UN ESTUDIO EN 13 CASOS CON LIQUEN PLANO FAMILIAR, LIQUEN PLANO SIN ENFERMEDAD HEPATICA Y ENFERMEDAD HEPATICA CON Y SIN LIQUEN PLANO LOS ANTIGENO DE HISTOCOMPATIBILIDAD DEMUESTRAN EN EL "CLUSTER" Y DENDOGRAMA UNA CIERTA RELACION CON LAS LESIONES Y DETERMINANDOS ANTIGENOS SIN SIGNIFICACION ESTADISTICA CLARA.

SE CONCLUYE QUE EN TODO ENFERMO CON LIQUEN PLANO DEBE INVESTIGARSE LA AFECCION HEPATICA DADA LA ELEVADA FRECUENCIA DE LA MISMA.

