GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Título: ASPECTOS CLINICOS E HISTOPATOLOGICOS DEL PENFIGO, PENFIGOIDE Y DERMATITIS HERPETIFORME.

Autor: PAREDES ESTEBAN ROSA M.

Universidad: GRANADA

Fecha de lectura: 01/01/1989

Tribunal:

ARMIJO MORENO MIGUEL	(presidente)
NOGALES FRANCISCO	(vocal)
ANEIROS CACHAZA JOSE	(vocal)
HERRERA CEBALLOS ENRIQUE	(vocal)
ORTEGA DEL OLMO ROSA MA	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
HISTOPATOLOGIA
PATOLOGIA

Resumen:

DENTRO DE LAS DERMATOSIS AMPOLLOSAS DE ORIGEN INMUNOLOGICO SE INCLUYEN TRES GRUPOS: PENFIGO, PENFIGOIDE Y DERMATITIS HERPETIFORME. HEMOS RECOGIDO 46 CASOS CORRESPONDIENTES A DICHAS DERMATOSIS Y LES HEMOS APLICADO UNOS PROTOCOLOS CLINICOS E HISTOPATOLOGICOS INCLUYENDO MICROSCOPIA OPTICA, ELECTRONICA INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA E INDIRECTA E INMUNOPEROXIDASA ASI COMO MICROSCOPIA INMUNOELECTRONICA CON TECNICA DE ORO COLOIDAL UNIDO A LA PROTEINA A.

EN EL PENFIGO ADVERTIMOS LA PRESENCIA DE AMPOLLAS DE LOCALIZACION INTRAEPIDERMICA Y DE ACUERDO A LA LOCALIZACION DE LA MISMA DISTINGUIMOS LAS SIGUIENTES VARIANTES: PENFIGO VULGAR Y VEGETANTE Y PENFIGO FOLIACEO Y ERITEMATOSO. EN TODOS ELLOS LA TECNICA DE INMUNO FLUORESCENCIA DEMUESTRA DEPOSITOS DE IPG EN EL ESPACIO INTERCELULAR Y ANTICUERPOS CIRCULANTES FRENTE A DICHA SUSTANCIA.

EL PENFIGOIDE AMPOLLOSO SE CARACTERIZA POR AMPOLLA SUBEPIDERMICA Y DEPOSITOS DE IPG Y COMPLEMENTO A NIVEL DE LA MEMBRANA BASAL. EN LA DERMATITIS HERPETIFORME LA AMPOLLA ES DE IDENTICA LOCALIZACION, LA INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA ES NEGATIVA Y LOS DEPOSITOS DE INMUNOGLOBULINA DEL TIPO IPA SE LOCALIZAN A NIVEL DE MEMBRANA BASAL. COMO GRUPO APARTE ESTUDIAMOS AQUELLOS

PACIENTES QUE PRESENTARON UNA DERMATOSIS AMPOLLOSA JUNTO
A UN TUMOR MALIGNO.