GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Título: CLASIFICACION INMUNOHISTOQUIMICA DE LOS PSEUDOLINFOMAS CUTANEOS.

Autor: TORNE ESCASANY RAMON
Universidad: BARCELONA

Fecha de lectura: 01/01/1987

Tribunal:

NALDA FELIPE MIGUEL ANGEL	(presidente)
CASTELLS RODELLAS ANTONIO	(vocal)
PUIGDOLLERS COLAS JOSE MARIA	(vocal)
DE MORAGAS VIÑAS JOSE MARIA	(vocal)
ESTRACH PANELLA MARIA TERESA	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA

Resumen:

CON EL FIN DE ESTABLECER UNA CLASIFICACION INMUNOHISTOQUIMICA DE LOS PSEUDOLINFOMAS CUTANEOS INVESTIGUE LA INMUNOARQUITECTURA DE 45 CASOS DE PSEUDOLINFOMAS CUTANEOS. EL GRUPO INCLUYE 40 PACIENTES 22 VARONES Y 18 MUJERES DE EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 11 Y 89 AÑOS (MEDIA 50 6 AÑOS) DIAGNOSTICADOS CLINICA E HISTOLOGICAMENTE DE PSEUDOLINFOMA CUTANEO EN SUS DIFERENTES VARIANTES CLINICAS. COMO MISCELANEA SE INCLUYO UN GRUPO DE 5 PACIENTES QUE PRESENTABAN ACRODERMATITIS CRONOICA ATROFIANTE. LAS MUESTRAS DE TEJIDO PROCEDENTE DE LAS BIOPSIAS CUTANEAS FUERON CONGELADAS Y MARCADAS CON UN PANEL DE 20 ANTICUERPOS MONOCLONALES UTILIZANDO UNA TECNICA DE INMUNOPEROXIDASA EN TRES FASES. LOS RESULTADOS INMUNOHISTOQUIMICOS FUERON EVALUADOS SEMICUANTITATIVAMENTE CON UNA ESCALA DE SEIS GRADOS.

LOS CASOS CLASIFICADOS COMO PSEUDOLINFOMAS A CELULAS T SE CARACTERIAN INMUNOHISTOLOGICAMENTE POR LA AUSENCIA DE ZONAS B LA PREDOMINANCIA DE CELULAS T COOPERADORAS/INDUCTORAS Y LA PRESENCIA DE CELULAS DE LANGERHANS/CELULAS INDETERMINADAS.

LOS CASOS DE PSEUDOLINFOMA DISEMINADO INFILTRACION LINFOCITARIA DE LA PIEL (JESSNER) PAPULOSIS LINFOMATOIDE CIERTAS REACCIONES A FARMACOS ESCABIOSIS PERSISTENTE Y DERMATITIS DE CONTACTO LINFOMATOIDE SIGUEN ESTE MODELO A CELULAS T.

EL GRUPO DE LOS PSEUDOLINFOMAS A CELULAS B SE CARACTERIZA POR LA PRESENCIA DE AGREGADOS DE CELULAS B QUE ESTAN EN RELACION CON CELULAS DENTRITICO RETICULARES Y CON LA EXPRESION TIPICA DE IGM Y IGD FORMANDO CENTROS

GERMINALES BIEN DESARROLLADOS (PSEUDOLINFOMAS A CELULAS B TIPO FOLICULAR). EN ALGUNOS CASOS LOS AGREGADOS DE CELULAS B NO ESTABAN ASOCIADOS A CELULAS DENTRITICO RETICULARES (PSEUDOLINFOMAS A CELULAS B TIPO NO FOLICULAR).

EN AMBOS CASOS LOS PSEUDOLINFOMAS A CELULAS B EXPRESAN SIEMPRE ZONAS T.

LAS ENTIDADES CLINICAS QUE SIGUEN ESTE MODELO INMUNOHISTOQUIMICO A CELULAS B SON LA LINFOADENOSIS BENIGNA CUTIS LINFOCITOMA DE CELULAS GRANDES Y OCASIONALMENTE LAS REACCIONES PERSISTE