GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA CALIDAD DE VIDA Y ANSIEDAD EN PACIENTES CON HIPERHIDROSIS PRIMARIA CON DENERVACIÓN SIMPÁTICA T2-T3

Autor: RAMOS IZQUIERDO RICARD

Universidad: BARCELONA

Departamento: PATOLOGIA I TERAP¿UTICA EXPERIMENTAL

Fecha de lectura: 14/07/2006

Direccion:

MOYA AMORÓS JUAN ANTONIO (director)

Tribunal:

JAURRIETA MAS EDUARDO (presidente)
PRATS GALINO ALBERTO (vocal)
SOLA MARTI ROMAN (vocal)
PAC FERRER JOAQUIN (vocal)
VIANNEY BLASI CABUS JUAN M. (secretario)

Descriptores:

CIRUGIA
DERMATOLOGIA

Resumen:

OBJETIVO

La simpaticolisis torácica endoscópica bilateral (STEB) es un tratamiento eficaz y mínimamente invasivo como tratamiento de la hiperhidrosis primaria. Nuestro objetivo es evaluar el nivel de ansiedad subjetivo y objetivo mediante una escala psicométrico estandarizada antes y después de la intervención.

PACIENTES Y MÉTODO

Un total de 106 pacientes diagnosticados de hiperhidrosis primaria y tratados mediante STEB fueron estudiados mediante un cuestionario reoperatorio y otro postoperatorio al os 12 meses de la intervención sobre: síntomas asociados a la hiperhidrosis, nivel subjetivo de ansiedad así como efecto de la misma sobre la vida diaria.
Paralelamente se les administró el cuestionario STAI (Cuestionario de ansiedad general Rasgo y Estado) y ICVD (Índice de Calidad de Vida en Dermatología).

RESULTADOS

Respecto a la sintomatología general asociada se observó como las palpitaciones se registraron preoperatoriamente en el 39,62% de los casos versus el 10,37% postoperatorio; temblor de manos en el 23,58% versus 8,49%, enrojecimiento facial en el 54,71% versus 11,32% cefalea en el 29,24% versus 9,43% y epigastralgia inespecífica e el 18,86% versus 6,6%; respectivamente. El nivel de ansiedad subjetiva referida por los pacientes sobre una escala comprendida entre 0 (no ansiedad() y 4 (ansiedad incapacitante) fue de 2,08 +/- 1,1 preoperatoriamente versus 0,39 +/- 0,67 postoperatoriamente, y el impacto sobre la vida diaria de la hiperhidrosis antes y después dela intervención también experimentó un descenso estadísticamente significativo. Los resultados obtenidos mediante el cuestionario de ansiedad general STAI