

TESIS DOCTORALES BASE DE DATOS TESEO

Título: CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA CELULA DE LANGERHANS EPIDERMICA EN PSORIASIS

DERMATITIS ATOPICA Y DERMATITIS DE CONTACTO ALERGICA.

Autor: ALONSO BLASI NURIA

Universidad: CÁDIZ

Fecha de lectura: 01/01/1987

Tribunal:

GOMEZ SANCHEZ JOSE (presidente)

LASANTA VILLAR JESUS (vocal)
SANCHEZ HURTADO GINES (vocal)
GOMEZ SALVADOR SANTIAGO (vocal)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS CIENCIAS MEDICAS DERMATOLOGIA HISTOPATOLOGIA PATOLOGIA

Resumen:

HEMOS ESTUDIADO EL COMPORTAMIENTO DE LA CELULA DE LANGERHANS EN LA DERMATITIS DE CONTACTO ALERGICA DERMATITIS ATOPICA Y LESIONES RECIENTES DE PSORIASIS VULGAR UTILIZANDO UNA TECNICA DE INMUNOPEROXIDASA INDIRECTA Y ANTICUERPO MONOCLONAL OKT6. EN LAS LESIONES DE DERMATITIS DE CONTACTO ALERGICA BIOPSIADAS A LAS 48 HORAS DEL TEST EPICUTANEO LA CELULA DE LANGERHANS SE COMPORTA COMO UNA CELULA ACTIVA POSIBLEMENTE PRESENTADORA DE ANTIGENOS EN LAS FASES EN LAS OUE EXISTE MAYORES CAMBIOS HISTOPATOLOGICOS CON UN INCREMENTO NOTABLE DE SU DENSIDAD NUMERICA. EN LA DERMATITIS ATOPICA EL NUMERO DE CELULAS DE LANGERHANS ESTA AUMENTADO TANTO EN LA PIEL AFECTADA COMO EN LA PIEL APARENTEMENTE INDEMNE DE ESTOS PACIENTES. SIN EMBARGO SE COMPORTA COMO UNA CELULA INACTIVA. EN LAS LESIONES RECIENTES DE PSORIASIS VULGAR EXISTE UN VACIAMIENTO DE CELULAS DE LANGERHANS COMO YA SE HA DESCRITO ANTERIORMENTE. LA TECNICA DE INMUNOPEROXIDASA INDIRECTA Y ANTICUERPO MONOCLONAL OKT6 ES UN METODO ESPEDIFICO DE IDENTIFICACION DE LA CELULA DE LANGERHANS CUYOS RESULTADOS NOS PARECEN MUY SATISFACTORIOS.