GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: CORRELACION CLINICO-HISTOLOGICA EN 88 CASOS DE PANICULITIS VULGARES. ESPECTRO CLINICO ERITEMA NUDOSO VASCULITIS NODULAR .

Autor: SANZ VICO M. DOLORES

Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID

Fecha de lectura: 01/01/1988

Tribunal:

GARCIA PEREZ, ANTONIO	(presidente)
ROBLEDO AGUILAR, ALFREDO	(vocal)
ARMIJO MORENO, MIGUEL	(vocal)
GARCIA DIEZ, AMARO	(vocal)
SANZ ESPONERA, JULIAN	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS

CIENCIAS MEDICAS

DERMATOLOGIA

Resumen:

SE ESTUDIAN 95 CASOS CONSECUTIVOS DE PANICULITIS.

ENCONTRANDOSE QUE 88 DE ELLOS (92,6 %) SE HALLAN DENTRO DEL ESPECTRO CLINICO DE ERITEMA NUDOSO-VASCULITIS NODULAR (EN-VN), POR LO QUE SE DENOMINA A ESTE GRUPO PANICULITIS VULGARES O COTIDIANAS POR CONTRAPOSICION A LOS OTROS SUBTIPOS MUCHO MAS INFRECUENTES DE PANICULITIS (PANARTERITIS NUDOSA CUTIS, PANICULITIS TRAUMATICA LUPUS PANICULITIS, ETC.).

UNA VEZ EFECTUADO EL ESTUDIO CLINICO SE OBSERVAN TRES VARIEDADES CLINICAS. EN EN. MIGRANS Y EN. ATIPICO, SE OBSERVAN RESPECTO AL GRUPO EN Y DOS FORMAS CLINICAS RESPECTO AL GRUPO UN: UN TIPICA Y UN ATIPICA.

EN EL ESTUDIO HISTOPATOLOGICO SE DISTINGUEN DOS PATRONES FUNDAMENTALES TOTALMENTE CONTRAPUESTOS: PANICULITIS SEPTAL (P.S.) Y PANICULITIS LOBULILLAR (P.L.).

EFECTUADA LA CORRELACION CLINICO-PATOLOGICA SE APRECIA QUE ESTA ES DEL 93% Y 94%PARA EL E.N. Y U.N. EN SUS FORMAS TIPICAS.