

TESIS DOCTORALES BASE DE DATOS TESEO

Título: DELIMITACION HISTOPATOLOGICA DE LA ENFERMEDAD DE BOWEN .

Autor: URRUTIA HERNANDO SUSANA Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID

Fecha de lectura: 01/01/1989

Tribunal:

GARCIA PEREZ ANTONIO (presidente)

ROBLEDO AGUILAR ALFREDO (vocal)
ARMIJO MORENO MIGUEL (vocal)
GARCIA DIEZ AMARO (vocal)
SANTIAGO COCA SANTIAGO (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS CIENCIAS MEDICAS DERMATOLOGIA

Resumen:

CON EL PROPOSITO DE DELIMITAR EL CONCEPTO HISTOPATOLOGICO DEL CARCINOMA IN SITU CUTANEO, ENFERMEDAD DE BOWEN (EB), RECOGIMOS 94 PACIENTES, 105 LESIONES CUTANES DE DIFERENTE LOCALIZACION Y 121 BIOPISIAS DE EB, ESTABLECIENDO UNOS CRITERIOS HISTOPATOLOGICOS DE SELECCION. SE EXPONEN EN LOS RESULTADOS LOS HALLAZGOS DE LOS DIFERENTES DATOS CLINICOS, E HISTOPATOLOGICOS, POSTERIORMENTE EFECTUAMOS CORRELACIONES ENTRE LOS PATRONES CLINICOS, HISTOPATOLOGICOS, Y CLINICO-HISTOPATOLOGICOS. APLICAMOS A ESTAS CORRELACIONES UN ESTUDIO ESTADISTICO.

ENCONTRAMOS UNA FRECUENCIA MAYOR DE EB EN MUJERES. LA EDAD MEDIA ERA DE 71,08 AÑOS. LOCALIZADA HABITUALMENTE, EN ZONAS EXPUESTAS A LA RADIACION SOLAR. GENERALMENTE, CORRESPONDE A UNA PLACA ERITEMATOEROSIVA/COSTROSA, UNICA, DE GRAN TAMAÑO, CON UN TIEMPO DE EVOLUCION DE 4,83 AÑOS.

OPINAMOS QUE LA EB COMO ENTIDAD PARANEOPLASICA, DEBE PERMANECER COMO UNA HIPOTESIS AUN NO DEMOSTRADA.

RECHAZAMOS EL TERMINO DE QUERATOSIS ACTINICA BOWENOIDE . EL HALLAZGO DE AFECTACION CONSTANTE DE ANEJOS, MELANOCITOS SUPRABASALES Y PREDOMINIO DE EROSION O COSTRA DIFERENCIAN LA EB DE LA QUERATOSIS ACTINICA.

OBSERVAMOS UN PATRON NUEVO DE FORMA EPIDERMICA, TIPO ACANTOMA. DESTACAMOS LA IMPORTANCIA DE LA CITOLOGIA BASALOIDE

LA EB SE TRATA DE UNA SOLA ENTIDAD CON MULTIPLES CARAS.