TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: DERMATITIS DE CONTACTO EN PERSONAL SANITARIO.

Autor: MARCOS DOMINGUEZ ANGEL JOSE
Universidad: SEVILLA

Fecha de lectura: 01/01/1997

Direccion:

CAMACHO MARTINEZ FRANCISCO	(director)

Tribunal:

GARCIA PEREZ ANTONIO	(presidente)
SOTILLO GAGO ISMAEL	(vocal)
BLASCO HUELVA PEDRO	(vocal)
MORENO GIMENEZ JOSE CARLOS	(vocal)
RODRIGUEZ PICHARDO ANTONIO	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
ENFERMEDADES PROFESIONALES
MEDICINA DEL TRABAJO

Resumen:

LAS DERMATITIS DE CONTACTO SON LAS DERMATOSIS PROFESIONALES MAS FRECUENTES. EL ECZEMA DE MANOS, GENERALMENTE DE CONTACTO, ES FRECUENTE ENTRE EL PERSONAL SANITARIO.

MEDIANTE UNA ENTREVISTA PERSONAL Y EXAMEN MEDICO DE 762 TRABAJADORES, HEMOS ENCONTRADO UNA PREVALENCIA DEL ECZEMA DE MANOS ENTRE EL PERSONAL SANITARIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA DE SEVILLA, DE UN 20,86%.

LOS POSIBLES FACTORES DE RIESGO, EDAD, SEXO PROFESION, TIEMPO DE PROFESION, LUGAR DE TRABAJO, ATOPIA PERSONAL, ATOPIA FAMILIAR, ANTECENDENTES DE DERMATITIS POR METALES, Y TIEMPO DIARIO DE USO DE GUANTES, FUERON EVALUADOS MEDIANTE UN ANALISIS DE REGRESION LOGISTICA MULTIVARIANTE. SOLO LA VARIABLE "EDAD" RESULTO SIGNIFICATIVA (P 0, 05).

EL 50% DE 70 TRABAJADORES CON ECZEMA DE MANOS MOSTRO ALGUNA SENSIBILIZACION. LOS ALERGENOS OCUPACIONALES REPRESENTARON EL 13,04% DE TODAS LAS SENSIBILIZACIONES.

GLUTARALDEHIDO, ETILENDIAMINA Y CLORHEXIDINA FUERON ALGUNOS DE LOS ALERGENOS OCUPACIONALES MAS SIGNIFICATIVOS.