GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: "DERMATOMICOSIS DE LOS PIES EN LOS TRABAJADORES DE LA MAR"

Autor: FERNANDEZ SANCHEZ M. CRISTINA

Universidad: OVIEDO

Departamento: MEDICINA

Fecha de lectura: 28/06/2001

Direccion:

TARDON GARCIA ADONINA	(director)
GARCIA CASAS JUAN BAUTISTA	(codirector)

Tribunal:

CUETO ESPINAR ANTONIO	(presidente)
GARCIA BENAVIDES FERNANDO	(vocal)
BUENO CAVANILLAS AURORA	(vocal)
DE IRALA ESTEVEZ JOKIN	(vocal)
OTERINO DE LA FUENTE DAVID	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
ENFERMEDADES PROFESIONALES
MEDICINA DEL TRABAJO

Localización: DEPARTAMENTO DE MEDICINA. FACULTAD MEDICINA C/JULIAN CLAVERIA,6-33006 OVIEDO

Resumen:

Las dermatomicosis de los pies son enfermedades cutaneas producidas por hongos, estos pueden ser dermatofitos o levaduras. Los objetivos del estudio son: conocer la prevalencia de dermatomicosis de los pies en dichos trabajadores y valorar el riesgo atribuible al tipo de trabajo en la dermatomicosis de los pies.

Los sujetos proceden del Servicio de Sanidad Maritima de Gijon y Aviles. La muestra representativa aleatoria(IC95% p<0,05) por tipo de trabajo es: 100 trabajadores de pesca de bajura, 90 mercante, 75 pesca de altura, 17 trafico interior y 10 buceadores. A todos los sujetos se les tomo muestra de escamas de los pies. De los 292 trabajadores 163 presentan lesiones clinicas; los cultivos fueron positivos en 32 de los que tenian lesiones clinicas. La prevalencia de dermatomicosis en individuos con signos clinicos es del 19,6%, correspondiendo el 14% a levaduras y el 5,6% a dermatofitos.

Los buceadores y los de pesca de altura son los que mas lesiones tienen. Por puesto de trabajo los de cubierta y los de maquinas son los mas afectados. Los que presentan hiperhidrosis y los que usan tenis tienen mas lesiones que los que no cumplen estos requisitos. Los cultivos positivos son tambien mas frecuentes en buceadores, en los de maquinas y de cubierta.