GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: ECZEMA DE CONTACTO. DATOS EPIDEMIOLOGICOS Y ESTUDIO DE LAS POSITIVIDADES MULTIPLES CON UNA SERIE STANDARD.

Autor: GARCIA BRAVO BEGOÑA

Universidad: SEVILLA

Fecha de lectura: 01/01/1988

Tribunal:

GARRIDO PERALTA MIGUEL	(presidente)
CAMACHO MARTINEZ FRANCISCO	(vocal)
MARTIN PASCUAL AGUSTIN	(vocal)
SOTILLO GAGO ISMAEL	(vocal)
GIMENEZ CAMARASA JOSE M	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS

CIENCIAS MEDICAS

DERMATOLOGIA

Resumen:

EL PROPOSITO DEL PRESENTE TRABAJO FUE REALIZAR UNA EPIDEMIOLOGIA DEL ECZEMA DE CONTACTO EN SEVILLA CON LA VALORACION DE LOS ALERGENOS MAS FRECUENTES EN NUESTROS PACIENTES Y LAS VARIACIONES EN LOS PORCENTAJES DE SENSIBILIZACION QUE HA HABIDO DURANTE LOS OCHO AÑOS RECOPILADOS. POR OTRA PARTE NOS PROPUSIMOS VALORAR ALGUNOS ASPECTOS DE LAS POSITIVIDADES MULTIPLES DENTRO DE LA SERIE STANDARD.

PARA ELLO SE REVISARON 1.624 PACIENTES (800 VARONES Y 824 MUJERES) EXPLORADOS MEDIANTE LA SERIE STANDARD EN LAS CONSULTAS EXTERNAS DE DERMATOLOGIA DEL H.U.S. DESDE 1.978 HASTA 1.985. OBTUVIMOS POSITIVIDADES EN EL 52.46% DE NUESTROSPACIENTES RECOGIENDO UNA ALTA PREVALENCIA DE SENSIBILIDAD A METALES SIENDO LOS MAS FRECUENTES CROMO (14.21%) COBALTO (13.11%) Y NIQUEL (19.96%). SON ALERGENOS IMPORTANTES TAMBIEN GOMAS Y PPDA (AMBOS EN VARONES) Y MERCURIO (DE USO MUY FRECUENTE EN NUESTRO MEDIO) PERFUMES Y PAB.

ANALIZAMOS LOS ALERGENOS QUE AUMENTARON EN LOS AÑOS ESTUDIADOS (FORMOL TREMENTINA) LOS QUE DISMINUYERON (SULFAMIDAS) Y AQUELLOS QUE MANTUVIERON UNA POSICION ESTABLE (CROMO Y NIQUEL) Y LAS CAUSAS.

EN EL ANALISIS DE LAS POSITIVIDADES MULTIPLES ESTUDIAMOS QUE ALERGENOS SE ASOCIAN CON MAYOR O MENOR FRECUENCIA DE LO ESPERADO Y CUALES FUERON LAS CAUSAS ENCONTRANDO MAYOR ASOCIACION ENTRE METALES DE CROMO-COBALTO Y COBALTO-NIQUEL PORSU CONCOMITANCIA EN CEMENTOS Y METALES.

ENTRE LOS DERIVADOS DE LA PARAFENILENDIAMINA EN PPDA-PAB PPDA-CAINA PPDA-PPD MIX Y CAINA-PAB. EN EL GRUPO METALES-GOMAS ENTRE COBALTO Y CROMO CON THIURAM Y CROMO CON CARBA MIX Y ENTRE LAS GOMAS ENTRE THIURAM CON CARBA Y MERCAPTO Y DPG CON CARBA Y THIURAM. POR EL CONTRARIO NO SE ASOCIARON METALES Y ALERGENOS DEL GRUPO PARA.