GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Título: ENFERMEDAD DEL INJERTO CONTRA EL HUESPED CUTANEA. ESTUDIO CLINICO, HISTOPATOLOGICO E INMUNOHISTOQUIMICO.

Autor: MARTIN ORTEGA ENCARNACION

Universidad: BARCELONA

Fecha de lectura: 01/01/1989

Tribunal:

ROZMAN BORSTAND CIRIL	(presidente)
HERRERO MATEU CARMEN	(vocal)
MORAGAS VIÑAS JOSE MARIA	(vocal)
CASTELLS RODELLAS ANTONIO	(vocal)
BOMBI LATORRE JOSE ANTONIO	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
HEMATOLOGIA
MEDICINA INTERNA

Resumen:

SE HA REALIZADO UN ESTUDIO CLINICO, HISTOPATOLOGICO E INMUNOHISTOQUIMICO DE LA ENFERMEDAD DEL INJERTO CONTRA EL HUESPED (EICH) CUTANEO-MUCOSA EN UN GRUPO DE 104 PACIENTES TRASPLANTADOS DE MEDULA OSEA ALOGENICA. LA INCIDENCIA DE LA EICH AGUDA FUE DEL 61,53% Y DEL 46,26% EN SU FASE CRONICA. LA PIEL Y MUCOSA ORAL FUERON LOS ORGANOS AFECTOS EN MAYOR PROPORCION EN AMBAS FASES.

DE LOS ESTUDIOS DE CORRELACION ENTRE LAS DISTINTAS VARIABLES CLINICAS Y PATOLOGICAS SE DETERMINO QUE LA SEVERIDAD CLINICA DE LA EICH CUTANEA AGUDA ESTUVO EN RELACION CON EL GRADO DE VACUOLIZACION EPIDERMICA Y EL MAYOR NUMERO DE QUERATINOCITOS NECROTICOS (QN). LA PROGRESION CLINICA DE LA EICH CUTANEA AGUDA HACIA FORMAS MAS GRAVES ESTUVO EN RELACION CON LA EXTENSION CLINICA DE LAS LESIONES, LA PRECOCIDAD DE PRESENTACION DE LA ENFERMEDAD, LA ALTERACION PATOLOGICA DIFUSA Y, EL GRADO DE EXOCITOSIS Y VACUOLIZACION EPIDERMICA. LA EDAD DEL DONANTE Y RECEPTOR FUERON LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO PARA PRESENTAR LA EICH CUTANEO-MUCOSA AGUDA. LA PROBABILIDAD DE PRESENTAR LA FASE CRONICA ESTUVO EN RELACION CON LA MAYOR EDAD DEL DONANTE Y RECEPTOR, EL ANTECEDENTE Y PRESENTACION TARDIA DE LA FASE AGUDA Y, COMO VARIABLES PATOLOGICAS, EL MAYOR NUMERO DE QN Y DE IMAGENES DE NECROSIS CELULAR SATELITE. LA PROBABILIDAD ACTUARIAL DE SUPERVIVENCIA EN ESTA SERIE FUE DEL 42% A LOS 3 AÑOS, CON UNA MEDIANA DE SUPERVIVENCIA DE 15 MESES.

INFLUYERON NEGATIVAMENTE EN LA SUPERVIVENCIA LA MAYOR EDAD DEL DONANTE Y RECEPTOR, LA INTENSIDAD CLINICA DE LA ENFERMEDAD AGUDA EN TODAS SUS LOCALIZACIONES, ESPECIALMENTE A NIVEL INTESTINAL, EL SER PORTADOR DE UNA LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA Y EL MAYOR NUMERO DE QN.

POR MEDIO DE TECNICA INMUNOHISTOQUIMICAS SE HA ESTUDIADO EN LAS BIOPSIAS DE PIEL Y MUCOSA ORAL: LAS CELULAS DE LNAGERHANS, LA EXPRESION DEL ANTIGENO HLA-DR, EL FENOTIPO DE LOS INFILTRADOS LINFOCITARIOS, EL DEPOSITO DE INMUNOGLOBULINAS Y COMPLEMENTO Y, LA DISTRIBUCION DEL COLAGENO Y PRO