GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: ENVEJECIMIENTO CUTANEO. ESTUDIO MORFOMETRICO DE LOS NUCLEOS DE LOS QUERATINOCITOS

Autor: MARTINEZ RODRIGUEZ ALBERTO

Universidad: MÁLAGA

Fecha de lectura: 01/01/1987

Tribunal:

GOMEZ SANCHEZ JOSE	(presidente)
PEREZ DE VARGAS FERRONI	(vocal)
CAMPOS MUÑOZ ANTONIO	(vocal)
MATILLA VICENTE ALFREDO	(vocal)
WILHELMI DE CAL MARIA LUISA	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS

CIENCIAS MEDICAS

DERMATOLOGIA

Resumen:

LOS FACTORES SELECCIONADOS EN ESTE TRABAJO QUE MUESTRAN UNA MAYOR INTERVENCION SON: LA EDAD EL GROSOR Y EL GRADO DE ENVEJECIMIENTO CLINICO E HISTOLOGICO. EL GRADO DE EXPOSICION AL SOL Y DE LA ZONA DE PIEL BIOPSIADA JUNTO CON EL BIOTIPO TIENEN UNA CLARA REPERCUSION SOBRE EL GRADO DE ENVEJECIMIENTO CLINICO E HISTOLOGICO.

LOS VALORES MEDIOS OBTENIDOS PERMITEN DESTACAR QUE: A) EXISTE UNA IRREGULARIDAD NOTABLE ENTRE LOS VALORES DE LOS DISTINTOS NUCLEOS MEDIDOS EN CADA CASO EXPRESADA POR LAS ALTAS CIFRAS DE DESVIACION ESTANDAR CORRESPONDIENTE A LOS PARAMETROS NUCLEARES MEDIDOS. B) ESTA DESIGUALDAD ES MARCADA EN EL ESTRATO BASAL(FACTOR FORMA). C) LOS NUCLEOS DEL ESTRATO ESPINOSO MUESTRAN UN TAMAÑO SUPERIOR EN AREA Y PERIMETRO. D) LA DESVIACION ESTANDAR DE AREA Y PERIMETRO SON SIMILARESEN AMBOS ESTRATOS. E) LOS NUCLEOS DEL ESTRATO ESPINOSO SON MAS REDONDOS Y MAS PARECIDOS ENTRE SI EN CUANTO A SU FORMA.

LOS VALORES MORFOMETRICOS SEGUN EL GRADO DE ENVEJECIMIENTO CLINICO E HISTOLOGICO MUESTRAN VARIACIONES MUY SIGNIFICATIVAS SUPERPONIBLES A LAS MOTIVADAS POR LA EDAD. EL GROSOR EJERCE UNA CLARA INFLUENCIA SOBRE EL TAMAÑO DE LOS NUCLEOS DE AMBOS ESTRATOS SIENDO LAS PIELES MAS GRUESAS LAS QUE DAN VALORESMAS ALTOS DE AREA Y PERIMETRO. LOS NUCLEOS DE AMBOS ESTRATOS TIENEN UNA FORMA MAS SIMILAR EN LAS PIELES DE LAS PERSONAS DE EDAD MAS AVANZADA LA MAS FINAS Y LAS QUE TIENEN UN ENVEJECIMIENTO CLINICO E HISTOLOGICO MAS ACUSADO.