

# TESIS DOCTORALES BASE DE DATOS TESEO

Título: EPIDEMIOLOGIA DE LAS MICOSIS SUPERFICIALES EN EL CENTRO DE SALUD EL VALLE DE

Autor: PADILLA MALO DE MOLINA ANASTASIA

Universidad: GRANADA

Departamento: MEDICINA (DERMATOLOGIA)

Fecha de lectura: 09/02/2002

## Direccion:

SAMPEDRO MARTÍNEZ ANTONIO (codirector)
DELGADO FLORENCIO VICENTE (director)

#### Tribunal:

SERRANO ORTEGA SALVIO (presidente)

JIMÉNEZ VALERA MARIA (vocal) ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS JOSE (vocal)

CARLOS

BUENDÍA EISMAN AGUSTÍN (vocal)

## **Descriptores:**

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS DE LA VIDA
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
FISIOLOGIA HUMANA

### Resumen:

Se trata de un estudio comunitario observacional prospectivo, con un periodo de seguimiento entre Enero de 1997 y Diciembre de 1999, en una Zona de Básica de Salud de Jaén capital cuyo centro de asistencia primaria es el Centro de Salud "EL VALLE".

Se fijaron como objetivos de este trabajo conocer la incidencia de las distintas micosis superficiales (tiñas, pitiriasis versicolor y candidas) en dicha zona Básica, así como su distribución por edad y sexo y factores epidemiológicos, analizar la concordancia entre sospecha clínica de micosis por médico de Atención Primaria y diagnóstico microbiológico y conocer la validez del examen directo como método de diagnóstico dermatomicosis.

De las 620 muestras sospechosas de micosis superficial se han confirmado micológicamente sólo el 28%. De estas un 43% han sido P.V., un 40% tiñas y el 17% candidosis.

La sospecha clínica de micosis superficial por mil habitantes en tres años ha sido de 40 casos; de ellas se han confirmado 11. La sospecha clínica de tiñas por mil habitantes en tres años ha sido 26, de las que se confirman menos de 5. Se sospechan 5 P.V., en tres años y por mil habitantes que se confirman por microscopía. La incidencia de candidosis es significativamente menor: 1.9 casos en tres años. Un 76% de los dermatofitos han sido zoofilicos, un 23% antropofílicos y sólo en una ocasión hemos aislado un geofílico. El gran mayoritario del estudio ha sido M.canis con casi el 50% de los aislamientos, seguido por T. Mentagrophytescon un 27%. La forma clínica

predominante ha sido t corporis con un 63% y en segundo lugar t.capitis con un 13%.

El Pitiriasis Versicolor un 56% han sido mujeres y un 44% varones. La media de edad ha sido de 30 años.

La Cándida ungueal ha sido la ppal forma clínica de candidosis con un 51%, excepto en esta forma clínica donde ha predominado C parapsilosis, en el resto de formas siempre hemos aislado C.albicans. La media de edad