GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: ESTUDIO CLINICO-TERAPEUTICO DEL PSORIASIS Y ARTRITIS PSORIASICA. VALORACION DE LA RESPUESTA AL ETRETINATO

Autor: DIEZ GARCIA LUIS FELIPE

Universidad: GRANADA

Fecha de lectura: 01/01/1989

Tribunal:

DE DULANTO Y ESCOFET FELIPE	(presidente)
CAMACHO MARTINEZ FRANCISCO	(vocal)
MORENO JIMENEZ JOSE CARLOS	(vocal)
SALVATIERRA RIOS DOMINGO	(vocal)
ORTEGA DEL OLMO ROSA MARIA	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
MEDICINA INTERNA
REUMATOLOGIA

Resumen:

SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PROSPECTIVO PARA VALORAR LA EFICACIA DEL RETINOIDE ETRETINATO EN PSORIASIS EN PLACAS MODERADOS SEVEROS Y EN LA ARTRITIS PSORIASICA. ASIMISMO SE VALORARON LAS CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS Y CLINICAS MAS IMPORTANTES DE LA POBLACION DE PACIENTES PSORIASICOS CANDIDATOS A LA ADMINISTRACION DE LA DROGA.

SE ESTUDIARON 145 PACIENTES CON PSORIASIS EN PLACAS MODERADO SEVEROS EL ETRETINATO EN REGIMEN DE MONOTERAPIA FUE UNA DROGA DE EFICACIA COMPARABLE AL PVVA LA ASOCIACION DE AMBOS TRATAMIENTOS (REPVVA) CONSIGUIO CON DOSIS MENORES, MEJORES EFECTOS TERAPEUTICOS, DISMINUYENDO LAS REACCIONES ADVERSAS. EL ETRETINATO, ADMINISTRADO COMO TRAT. DE MANTENIMIENTO PROLONGO EL PERIODO DE REMISION DE LOS PACIENTES TRATADOS INICIALMENTE CON ETRETINATO O REPVVA.

ASIMISMO SE ESTUDIARON 125 PACIENTES CON ARTRITIS PSORIASICA, 24 DE LOS CUALES RECIBIERON ETRETINATO PROSPECTIVAMENTE EN LA MAYORIA DE CASOS EL PSORIASIS PRECEDIO A LA ARTRITIS. SIENDO AQUEL EN GENERAL DE CARACTER LEVE, SI BIEN LOS PSORIASIS SEVEROS SE ASOCIARON CON ARTRITIS EVOLUTIVAMENTE MAS GRAVES. LA EXPRESION DE HLA-B27 CONDICIONO MAYOR FRECUENCIA DE AFECTACION AXIAL Y LESIONES EXTRAARTICULARES, Y LA DEL HLA-CN6 FUE UTIL EN EL DIAGNOSTICO DE LOS CASOS QUE DEBUTARON CON ARTRITIS.

EL ETRETINATO FUE UNA DROGA EFICAZ SOBRE LAS MANIFESTACIONES ARTICULARES Y CUTANEAS CONSIGUIENDO RESPUESTAS SATISFACTORIAS EN EL 70% Y 77% DE LOS CASOS RESPECTIVAMENTE.

EL ETRETINATO PRODUJO REACCIONES ADVERSAS EN TODOS LOS CASOS, EN GENERAL LEVES, BIEN TOLERADAS Y DOSIS DEPENDIENTES.