

## TESIS DOCTORALES BASE DE DATOS TESEO

Título: ESTUDIO CLINICO, HISTOPATOLOGICO E INMUNOGENETICO DE LAS LESIONES CUTANEAS

**DEL LUPUS ERITEMATOSO** 

Autor: BIELSA MARSOL M. ISABEL

Universidad: BARCELONA

**Fecha de lectura:** 01/01/1992

## **Tribunal:**

CASTELLS RODELLAS ANTONIO (presidente)

DE MORAGAS VIÑAS JOSE MARIA (vocal)
HERRERO MATEU CARMEN (vocal)
BOMBI LATORRE J. ANTONIO (vocal)

FONT FRANCO JOSEP (secretario)

## **Descriptores:**

CIENCIAS CLINICAS CIENCIAS MEDICAS DERMATOLOGIA

## Resumen:

SE ESTUDIAN LAS CARACTERISTICAS CLINICAS,
HISTOPATOLOGICAS E INMUNOGENETICAS DE 93 PACIENTES
AFECTOS DE LUPUS ERITEMATOSO CUTANEO. DE ELLOS, 37
DESARROLLARON UN LUPUS ERITEMATOSO CUTANEO CRONICO (LECC)
Y 56 UN LUPUS ERITEMATOSO CUTANEO SUBAGUDO (LECS). EL
PATRON ANULAR DE ESTE ULTIMO TIPO DE LUPUS ERITEMATOSO
CUTANEO SE OBSERVO EN 32 PACIENTES MIENTRAS QUE EN LOS 24
RESTANTES LAS LESIONES PRESENTARON UNA MORFOLOGIA
PAPULOESCAMOSA.

EN LOS TRES GRUPOS ESTUDIADOS LA ACTIVIDAD DEL PROCESO LUPICO SE CENTRO EMINENTEMENTE EN LA PIEL. LAS LESIONES CUTANEAS CONSTITUYERON LA PRINCIPAL MANIFESTACION CLINICA DE LA ENFERMEDAD MIENTRAS QUE LAS COMPLICACIONES VISCERALES NO FUERON FRECUENTES NI RELEVANTES. DE ESTAS LAS ALTERACIONES HEMATOLOGICAS FUERON LAS MAS FRECUENTES Y LAS UNICAS DETECTADAS EN EL LECC. EN EL ESTUDIO HISTOPATOLOGICO OBSERVAMOS QUE LOS CAMBIOS EPIDERMICOS (NUMERO DE CHERPOS COLOTDES Y DEGENERACION HIDROPICA DE LA CAPA BASAL) PREDOMINARON EN EL LECS DE MORFOLOGIA ANULAR, MIENTRAS QUE EN LECC FUERON MAS IMPORTANTES LAS ALTERACIONES DERMICAS, SOBRE TODO EL ENGROSAMIENTO DE LA MEMBRANA BASAL, LOS CUERPOS COLOIDES DERMICOS Y EL INFILTRADO PERIANEXIAL. LA NECROSIS EPIDERMICA FUE UN HALLAZGO HISTOPATOLOGICO CARACTERISTICO DEL LECS-ANULAR MIENTRAS QUE LA ATROFIA PILOSEBACEA LO FUE DEL LECC. EN AMBOS CASOS TALES CAMBIOS FUERON POCO FRECUENTES. SIN EMBARGO, A PESAR DE LAS DIFERENCIAS HASTA AQUI SEÑALADAS, ESTAS NO FUERON LO SUFICIENTEMENTE INTENSAS NI FRECUENTES COMO PARA SER CAPACES DE DISCRIMINAR, DESDE UN PUNTO DE VISTA ESTRICTAMENTE HISTOPATOLOGICO Y CON MARGENES DE

ERROR ACEPTABLES, ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS CLINICOS DE LUPUS ERITEMATOSO CUTANEO. EL ESTUDIO INMUNOGENETICO DEMOSTRO QUE LOS PACIENTES CON LESIONES ANULARES DE LECS PRESENTABAN UN INCREMENTO EN LA FRECUENCIA DE LOS ANTIGENOS HLA-B8 Y DR3 (OR DE 4,6 Y 4,3 RESPECTIVAMENTE) ASI COMO UNA MAYOR FRECUENCIA DE ANTICUERPOS DIRIGIDOS FRENTE AL ANTIGENO RO (60%). POR TANTO, SOL