GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: ESTUDIO COMPARATIVO DEL GRANULOMA PIOGENICO Y EL TEJIDO DE GRANULACION EXPERIMENTAL

Autor: SANCHEZ GONZALEZ ROSALBA

Universidad: LA LAGUNA

Fecha de lectura: 01/01/1994

Direccion:

DIAZ FLORES FEO LUCIO (director)

Tribunal:

FERRES TORRES ROMUALDO (presidente)
LOPEZ ALONSO ANTONIO (vocal)
GAYOSO RODRIGUEZ MANUEL J. (vocal)
VARELA ANSEDES HILDA (vocal)
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDMUNDO (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
PATOLOGIA
PATOLOGIA EXPERIMENTAL

Resumen:

SE PRESENTO UN ESTUDIO COMPARATIVO DEL GRANULOMA PIOGENO CON EL TEJIDO DE GRANULACION EXPERIMENTAL. EN UNA PRIMERA PARTE REALIZARON UN ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO DEL GRANULOMA PIOGENICO COMPARANDOLO CON LOS DATOS OBTENIDOS EN LA REVISION BIBLIOGRAFICA. SEGUIDAMENTE HICIERON UNA VALORACION HISTOLOGICA DE LOS MISMOS REALIZANDO VALORACIONES SEMICUANTITATIVAS DE SUS ESTADIOS. EN UNA SEGUNDA PARTE, REVISARON MUESTRAS DE TEJIDO DE GRANULACION OBTENIDAS EN OTRAS EXPERIENCIAS, UTILIZANDO ESTAS COMO GRUPO CONTROL. A CONTINUACION PROCEDIERON A REALIZAR DOS SERIES EXPERIMENTALES EN LAS QUE ADMINISTRARON FACTORES DE CRECIMIENTO (PDGF, FGF Y TGF) UTILIZANDO SEGMENTOS DE VENA FEMORAL Y DE NERVIO CIATICO CON LA FINALIDAD DE EMPLEARLOS A MODO DE RECEPTACULOS.

POR ULTIMO REALIZARON UNA TERCERA SERIE EN LAS QUE ADMINISTRARON PROSTAGLANDINAS F1 Y F2 DISUELTAS EN TRIACETINA CON EL OBJETO DE ESTIMULAR LA ANGIOGENESIS.

ENTRE LOS RESULTADOS MAS DESTACADOS, LLAMA LA ATENCION LOS OBTENIDOS CON LA ADMINISTRACION DE FGF, CON EL QUE OBTIENEN RESULTADOS SEMEJANTES AL GRANULOMA PIOGENICO.

CON LA ADMINISTRACION DE PROSTAGLANDINAS OBTIENEN RESULTADOS SIMILARES AL GRANULOMA PIOGENICO EN FASES

INICIALES, SIN EMBARGO EN FASES TARDIAS SE ASEMEJA MAS A LO QUE OCURRE EN EL TEJIDO DE GRANULACION. ESTE HECHO LO JUSTIFICA POR LA ADMINISTRACION DE PROSTAGLANDINAS EN DOSIS UNICAS. COMO CONCLUSION MAS IMPORTANTE DESTACA EL QUE CONSIDERAN AL GRANULOMA PIOGENICO COMO UNA PROLIFERACION VASCULAR TIPO TEJIDO DE GRANULACION DESENCADENADO POR UN DISBALANCE LOCAL Y MANTENIDO DE LOS FACTORES QUE MODULAN LA MICROCIRCULACION.