GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE BLEOMICINA INTRALESIONAL Y CRIOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE VERRUGAS VULGARES Y/O PALMO-PLANTARES

Autor: BARCALA VÁZQUEZ LUIS

Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID

Departamento: MEDICINA II (DERMATOLOGIA)

Fecha de lectura: 27/11/2001

Direccion:

HERNÁNDEZ MORO BENEDICTO	(director)
PÉREZ DE OTEIZA CARLOS	(codirector)

Tribunal:

IGLESIAS OTEL LUIS	(presidente)
GARCÍA UTIEL AMARO	(vocal)
TORRELO FERNÁNDEZ ANTONIO	(vocal)
HARTO CASTAÑO ANTONIO	(vocal)
SÁNCHEZ EVARISTO	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS

CIENCIAS MEDICAS

DERMATOLOGIA

Localización: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - ARCHIVO GENERAL - PABELLON DE GOBIERNO ISAAC PERAL, S/N 28040 MADRID

Resumen:

INTRODUCCION

Las verrugas vulgares son lesiones cutáneo-mucosas producidas por el virus del papiloma humano. Tienen una distribución mundial, constituyen un 10-25% de las consultas dermatológicas. Existen múltiples tratamientos descritos, y entre ellos destacan la bleomicina intralesional y la crioterapia.

HIPÓTESIS

La bleomicina intralesional es el mejor tratamiento para las verrugas vulgares y/o palmo-plantares.

OBJETIVOS

1,- Comprobar que la bleomicina intralesional es un método eficaz en el tratamiento de las verrguas vulgares y/o palmo-plantares.

2,- Comparar la eficacia de la bleomicina intralesional y la crioterapia en el tratamiento de las verrugas vulgares y/o plano-plantares.

3,- Determinar si exite alguna relación estadísticamente significativa entre los resultados de los tratamientos empleados (Bleomicina intralesional o crioterapia) y el sexo edad o antecedentes personales o familiares de los pacientes de padecer verrugas y el tamaño, tiempo de evolución, localización o tratamiento previo de las verrugas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudiaron 101 pacientes de cualquier edad y sexo. Se analizaron 180 verrugas distribuidas en dos grupos de 90 verrugas, que se asignaron a cada uno de los dos tratamientos. Dentro de las 180 verrugas, 60 de ellas se localizaron en dorso de manos, 60 en palmas y 60 en plantas. Estudio tipo ensayo clínico comparando dos proporciones de forma unilateral. Se recogieron la variables sexo, edad y antecedentes familiares y personales de padecer verrugas y tamaño, tiempo de evolución, localización y tratamiento previo que recibieron las verrugas.

Criterios de inclusión: No padecer enfermedades orgánicas o padecimientos psiquiátricos. Pacientes no sometidos a medicación y que no se hubiesen tratado las verrugas al menos en el último mes.

La bleomicina se utilizó a dosis de 0,1 ml si la verruga era menor o igual a tres mm de diámetro, y 0,2 ml si era mayor de tres