GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DEMANDA ASISTENCIAL DE DERMATOLOGÍA EN EL ÁREA DE SALUD DE UN HOSPITAL DE REFERENCIA

Autor: PORTA AZNÁREZ M. NIEVES

Universidad: ZARAGOZA

Departamento: MEDICINA, PSIQUIATRIA Y DERMATOLOGIA

Fecha de lectura: 26/04/2002

Direccion:

GRASA JORDÁN M. PILAR	(director)
SIMAL GIL ESTRELLA	(codirector)

Tribunal:

CARRAPETO MÁRQUEZ DE PRADO FRANCISCO	(presidente)
BOSH GARCÍA RICARDO	(vocal)
QUEROL MASARRE IGNACIO	(vocal)
HERNÁNDEZ NAVARRETE M. JESÚS	(vocal)
GARCÍA LATASA DE ARANIBAR JAVIER	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS

CIENCIAS MEDICAS

DERMATOLOGIA

SALUD PUBLICA

Resumen:

El trabajo realizado corresponde a un estudio epidemiológico descriptivo en el que se pretende: definir las características epidemiológicas de los pacientes remitidos al servicio de dermatología del hospital "Miguel Servet" de Zaragoza; computar, analizar y describir la patología dermatológica existente en el área de salud; determinar las tasas de incidencia de las enfermedades dermatológicas más frecuentes; y, establecer el nivel de correlación existente entre el motivo de consulta y el diagnóstico dermatológico final.

Se detallan en primer lugar las características demográficas y la estructura sanitaria de la Comunidad Autónoma Aragonesa (CAA) y concretamente de las áreas II y V. Se ha tomado como muestra poblacional a aquellos pacientes que acudieron por primera vez, a las consultas de dermatología de las áreas II y V entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1998, un total de 20.350 pacientes, con los que se ha creado una base de datos para el estudio.

Se observa una mayor frecuencia de consulta en mujeres frente a varones, con diferencias significativas. La edad media es de 42,79 años, sin mostrar diferencias significativas entre ambos sexos. La distribución a lo largo del año muestra una media de 1.695 pacientes nuevos/mes. La demanda asistencial según el ámbito de procedencia rural/urbano muestra diferencias significativas, siendo mayor en el medio urbano. La demanda asistencial es mayor en los ambulatorios no convertidos a centros de salud, que en los centros de salud propiamente dichos, con diferencias significativas entre ambos.

Las tasas de incidencia se han normalizado con referencia a la población de las áreas II y V en el caso de las distintas zonas de salud y con referencia a las poblaciones europea y mundial tipo de la OMS, en el caso de las tasas de incidencia globales de las áreas II y V.

La mayor tasa de incidencia de enfermedad dermatológica la encontramos en la zona urbana de San Jos