GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Título: ESTUDIO DE LA PRESENCIA DE DISPLASIA MELANOCITICA EPIDERMICA (DME) EN LAS LESIONES MELANICAS.

Autor: HORNDLER ARGARATE CARLOS

Universidad: ZARAGOZA

Fecha de lectura: 01/01/1991

Direccion:

MOROS GARCIA MANUEL (director)

Tribunal:

RAMON Y CAJAL JUNQUERA (presidente)
MARTINEZ PEÑUELA JOSE MARIA (vocal)
LAZARO PEREZ JESUS (vocal)
GIMENEZ MAS JOSE ANTONIO (vocal)
RUIZ LISO JUAN MANUEL (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA

Resumen:

SE HAN ESTUDIADO EN EL PRESENTE TRABAJO 229 NEVUS Y 89 MELANOMAS RECOGIDOS EN EL ARCHIVO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL MIGUEL SERVET DE ZARAGOZA. EN DICHAS LESIONES SE HAN ESTUDIADO LA PRESENCIA DE DME.

SE VALORARON 17 PARAMETROS: EDAD, SEXO, LOCALIZACION, TIPO DE LESION, TIPO CELULAR, MELANIZACION, REACCION LINFOCITARIA, SIGNOS DE REGRESION NEVUS ADYACENTES A LA LESION, MICROSATELITOSIS, INDICE DE BRESLOW, NIVEL DE CLARK, INDICE MITOTICO, ULCERACION, TAMAÑO DE LA LESION, SUPERVIVENCIA Y PARAMETROS MORFOMETRICOS NUCLEARES.

A PARTIR DE LOS PARAMETROS ESTUDIADOS SE DETERMINO QUE LA DME ES MAS FRECUENTE EN NEVUS CONGENITOS, LOCALIZADOS EN EXTREMIDADES. DENTRO DEL GRUPO DE LOS MELANOMAS, LA PRESENCIA DE DME ERA MAS FRECUENTE EN EL SEXO FEMENINO Y EN AQUELLOS CASOS EN QUE LOS MELANOMAS ESTABAN FUERTEMENTE PIGMENTADOS Y QUE PRESENTABAN UN INDICE DE BRESLOW MENOR A 2,15 MM.

EL ESTUDIO MORFOMETRICO EVIDENCIO UN ESPECTRO DE LAS ALTERACIONES NUCLEARES (AREA Y PERIMETRO) ENTRE LOS DIFERENTES PATRONES DE DME CON VALORES MINIMOS EN EL PATRON INDETERMINADO Y MAXIMOS EN LOS PATRONES MIXTO Y NEVOIDE.