GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Título: ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO DE LA MANCHA MONGOLICA. (MM)

Autor: NAVAS RAMIREZ JESUS
Universidad: SEVILLA

Fecha de lectura: 01/01/1990

Tribunal:

GARCIA PEREZ ANTONIO	(presidente)
MORENO GIMENEZ JOSE CARLOS	(vocal)
ARGUELLES MARTIN FEDERICO	(vocal)
GARCIA BRAVO BEGOÑA	(vocal)
SANCHEZ PEDREÑO PALOMA	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
PEDIATRIA

Resumen:

LA MANCHA MONGOLICA ES UNA DERMATOSIS PROPIA DEL RECIEN NACIDO (RN) SOBRE LAS QUE EXISTEN POCAS REFERENCIAS EN LA LITERATURA MUNDIAL Y QUE NO HA SIDO ESTUDIADA EN NUESTRO PAIS. ESTE ES EL PRIMER ESTUDIO QUE SE REALIZA EN LA COMUNIDAD ANDALUZA. PARA ELLO SE ESTUDIARON 1027 RN EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VG MACARENA DE SEVILLA EN LOS ULTIMOS 3 MESES DEL AÑO 1988 EN EL 2 DIA DE NACIMIENTO, EFECTUANDOSE UN SEGUIMIENTO DE LOS NIÑOS CON MM EN LOS MESES 1, 3, 7 Y 12.

SE ENCONTRO MM EN UN 12.9% DE LOS RN, SIENDO SU LOCALIZACION MAS FRECUENTE LA REGION SACROCOXIGEA CON UN 75.9 % Y EL TAMAÑO MEDIO DE 15.9 CM2.

EN EL PRIMER AÑO DESAPARECIO EN UN 55.8 % DE LOS CASOS APARECIENDO EN NUEVAS LOCALIZACIONES EN UN 18 %.

ANALIZANDO EL FACTOR RAZA HEMOS ENCONTRADO UNA ASOCIACION ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVA CON LA RAZA GITANA, DEMOSTRANDO MM EN EL 40 % DE LOS RN QUE PERTENECIAN A ELLA.

EXISTE UNA TENDENCIA DE LA MM A DESAPARECER CON EL TIEMPO INDEPENDIENTEMENTE DEL TAMAÑO DE LA MISMA EN EL NACIMIENTO.

LAS ALTERACIONES DERMATOLOGICAS MAS FRECUENTES EN EL RN FUERON: EXANTEMA TOXICO EN EL 30.4 %, ICTERICIA EN EL 29.1%, MANCHA SALMON EN EL 15.6%, LESIONES POR ROCE EN EL 13.9% MILIAR EN EL 4%, OTROS ANGIOMAS EN EL 3.4%,

CEFALOHEMATOMA O CAPUT SUCCEDANEUM EN EL 3%, LESIONES POR LAS UÑAS EN EL 2.9%, NEVUS PIGMENTARIOS CONGENITOS EN EL 1.6% Y NEVUS DE OTA EN EL 0.1%.

NO EXISTIO RELACION ESTADISTICA ENTRE LA PRESENCIA DE ALGUNA DE ESTAS DERMATOSIS Y LA PRESENCIA DE MM, EXCEPTO EN EL CASO DEL NEVUS FLAMEUS Y/O NEVUS VASCULOSUS NUCHAE (MANCHA SALMON) EN LA QUE SI SE ENCONTRO.