GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: EVALUACION MEDICO-PSICOLOGICA DE LA ALOPECIA AREATA INFANTO-JUVENIL.

Autor: DIAZ ATIENZA FRANCISCO

Universidad: GRANADA

Fecha de lectura: 01/01/1998

Direccion:

GURPEGUI FERNANDEZ DE LEGARIA MANUEL (director)

Tribunal:

RUIZ OGARA CARLOS (presidente)

RODRIGUEZ SACRISTAN JAIME (vocal)

POLAINO LORENTE AQUILINO (vocal)

MARDOMINGO SANZ MARIA JESUS (vocal)

MUÑOZ HOYOS ANTONIO (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS

CIENCIAS MEDICAS

DERMATOLOGIA

PSIQUIATRIA

Resumen:

Se ha realizado estudio psicobiológico y familiar de 39 sujetos afectados de alopecia areata (AA). Los resultados se han comparado con los obtenidos por sus hermanos sanos (HS) y otra muestra formada por sujetos con epilepsia (EP). Los sujetos con AA presentan niveles más altos de leucocitos y tiroxina que sus HS; y niveles más altos de leucocitos, neutrófilos, VSG, PCR, y tiroxina que los niños con EP. La excreción urinaria de catecolaminas en 24 horas y el número de células NK son más elevados en los niños con EP y los niños con AA que en los HS. Los tres grupos no presentan diferencias significativas en síntomas depresivos, ansiedad estado/rasgo y factores de personalidad. Sin embargo, en el año previo a la aparición del trastorno, los niños con AA están expuestos a mayor número de acontecimientos vitales que lso niños con EP; y ambos grupos, a mayor número que los HS. Las familias de los pacientes con AA se describen con un menor grado de expresividad entre sus miembros, más autónomos y menos organizadas que las familias de los niños con EP. Igualmente, entre los pacientes con AA aparecen una mayor proporción de familias incompletas.