GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Título: FACTORES PREDICTIVOS, CLINICOS E HISTOPATOLOGICOS DE LA RECIDIVA DE LOS CARCINOMAS BASOCELULARES PRIMARIOS EXTIRPADOS CON CIRUGIA EXCISIONAL.

Autor: PAZOS CAMPOS JOSE MANUEL

Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA

Departamento: MEDICINA

Fecha de lectura: 01/01/1999

Direccion:

TORIBIO PEREZ JAIME (director)

Tribunal:

PEREZ OLIVA NARCISO (presidente)
VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO (vocal)
FONSECA CAPDEVILA EDUARDO (vocal)
ZULAICA GARATE ANDER (vocal)
PEREIRO FERREIROS MANUEL (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA

Resumen:

Se realiza un análisis estadístico de los factores que influyen en la recidiva de los carcinomas basocelulares de la piel que son extirpados quirúrgicamente. Se estudian las lesiones extirpadas en el período 1987-1990 y se realiza un seguimiento de los casos hasta el 1 de enero de 1998. Se comparan datos clínicos e histológicos con un grupo control del mismo período en el cual no hubo recidiva tumoral, teniendo en cuenta la duración de la lesión, edad de los pacientes, diámetro de la lesión, sexo, localización, tipo clínico, tipo histológico, margen histológico, tiempo de recidiva y tiempo de seguimiento.

Se concluye que el tipo histológico, margen histológico y diámetro de la lesión, son los principales marcadores de la recidiva tumoral, mientras que el tiempo de evolución, edad del paciente, sexo y localización de las lesiones no lo son. Asimismo, el seguimiento de este tipo de lesiones debe ser prolongado, ya que las recidivas pueden aparecer hasta 10 años después de la extirpación, aunque el cincuenta por ciento lo hacen durante los dos años siguientes a la extirpación.