GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: "FACTORES PRONÓSTICOS DE LA MICOSIS FUNGOIDE Y SÍNDROME DE SEZARY"

Autor: GOMEZ DIEZ SANTIAGO F.

Universidad: OVIEDO

Departamento: MEDICINA

Fecha de lectura: 26/11/1999

Direccion:

FRESNO FORCELLEDO MANUEL FLORENTINO	(codirector)
PEREZ OLIVA NARCISO	(director)

Tribunal:

TORIBIO PEREZ JAIME	(presidente)
PETEIRO GARCIA CARMEN	(vocal)
MIRANDA ROMERO ALBERTO	(vocal)
RODRIGUEZ-VIGIL FERNANDEZ	(vocal)
VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS

CIENCIAS MEDICAS

DERMATOLOGIA

Resumen:

La micosis fungoide (MF) y el síndrome de Sézary(SS) son linfomas cutáneos primarios de células T epidermotropos caracterizados por una proliferación de linfocitos neoplásicos de pequeño o mediano tamaño. En este estudio hemos recogido 50 pacientes diagnosticados de MF y SS, durante el periodo comprendido entre enero de 1985 a junio de 1998, con la finalidad de estudiar sus características clínicas, analíticas, histopatológicas e inmunohistoquímicas,
y poder establecer su utilidad como factores pronósticos. En los resultados encontramos que las variables con significación pronóstica en el análisis univariante son: la extensión de la enfermedad, forma clínica, transformación a linfoma de célula grande, tipo de respuesta al tratamiento, leucocitosis por encima de 20.000,presencia de células atípicas circulantes valor de LDH y atípia de los linfocitos; en el análisis multivariante las variables con valor pronóstico adverso son la transformación a linfoma de célula grande y la presencia de más de un 10% de células atípicas circulantes en sangre periférica.