TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: HELICOBACTER PYLORI Y PATOLOGIA CUTANEA. ESPECIAL INCIDENCIA EN ROSACEA Y URTICARIA CRONICA.

Autor: ROJO GARCIA JOSE M.

Universidad: SEVILLA

Fecha de lectura: 01/01/1998

Direccion:

ESCUDERO ORDOÑEZ JERONIMO	(director)

Tribunal:

CAMACHO MARTINEZ FRANCISCO	(presidente)
SOTILLO GAGO ISMAEL	(vocal)
CRESPO ERCHIGA VICENTE	(vocal)
HERGUETA DELGADO PEDRO	(vocal)
MORENO GIMENEZ JOSE CARLOS	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS

CIENCIAS MEDICAS

DERMATOLOGIA

Resumen:

A lo largo de tres años 1995-98 hemos completados los estudios de 58 pacientes adultos que fueron seleccionados en base a la presencia de una infección por Helicobacter Pylori, 39 mujeres y 22 varores con diagnostico dermatológico de ROSACEA (37 pacientes) y de URTUCARIA CRONICA (21 pacientes).

Desde el comienzo del trabajo realizado para optar la tesis doctoral, se ha podido comprobar que este microorganismo (Helicobacter Pylori) constituye un agente patogeno importante en el tracto gastrointestinal superior, adeptandose que es la causa principal de la Gastritis Cronica activa y un factor esencial en la ulcera peptica tanto gastrica como duodenal.

Así mismo podemos sugerir que en estudios realizados de pacientes con ROSACEA Y URTICARIA CRONICA con diagnosticos digestivos demostrados por endoscopias, test del aliento con C13 y Serologia para Helicobacter Pylori positiva; donde estan implicadas las toxinas y enzimas potencialmente toxicas.

Igualmente se ha comprobado como la mejoria clinica de las dermatosis estudiadas: Rosacea (76% de 37 pacientes) y Urticaria cronica (89% de 21 pacientes), y la consiguiente mejoria digestiva (81% de 58 pacientes, 46 con Gastritis Cronica y 9 con Ulcera Gastroduodenales); se debe a las siguientes pautas terapeutica Pauta.....O.C.A. (Omeprazol 20 mgrx, Amoxicilina 750 mgr

a 1 grx2, Claritromimicina 500 mgrx2) durante dos semanas y Pauta.....O.M.C. (Omeprazol 20 mgrx2 y Metronidazol 250 mgrx2 y Claritro micina 500 mgr x2) durante dos semanas, terapia herradicadora del 95% para Helicobacter Pylori.