GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Título: LINFOMAS CUTANEOS B Y VARIEDADES NO CLASICAS DE LINFOMAS CUTANEOS T. ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS CLINICAS, HISTOPATOLOGICAS, INMUNOFENOTIPICAS E INMUNOGENOTIPICAS.

Autor: FORMIGON ROIG MANUEL

Universidad: BARCELONA

Fecha de lectura: 01/01/1997

Direccion:

ESTRACH PANELLA M. TERESA (director)

Tribunal:

CASTELLS RODELLAS ANTONI (presidente)
LECHA CARRALERO MARIO (vocal)
ORDI MAJA JAUME (vocal)
MARTI LABORDA ROSA M. (vocal)
SERVITJE BEDATE OCTAVIO (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA

Resumen:

EL ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS CLINICAS, HISTOPATOLOGICAS, INMUNOFENOTIPICAS E INMUNOGENOTIPICAS DE 32 PACIENTES AFECTOS DE LINFOMAS NO HODGKIN CUTANEO, EXCLUYENDO AQUELLOS QUE PRESENTAN UN LCCT CLASICO TIPO MICOSIS FUNGOIDE Y SINDROME DE SEZARY, ESTABLECE LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES: ESTE GRUPO DE LINFOMAS ESTA CONSTITUIDO POR LINFOMAS DE ESTIRPE B Y T CON UNA FRECUENCIA 2:1. LOS LINFOMAS B PRESENTAN FRECUENTEMENTE LESIONES NODULOTUMORALES LOCALIZADAS EN CABEZA O EXTREMIDADES. LOS LINFOMAS T PRESENTAN FRECUENTEMENTE LESIONES EN PLACA TUMORAL LOCALIZADAS EN TRONCO. EN EL ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO, LA SENSIBILIDAD DE LOS ANTICUERPOS MONOCLONALES UTILIZADOS SOBRE TEJIDO INCLUIDO EN PARAFINA ES MAYOR QUE LA DE LOS UTILIZADOS SOBRE TEJIDO CONGELADO. UNA BATERIA DE ANTICUERPOS COMPUESTA POR LCA, UCHL1, MT1, OPD4, L26, MB2, BERH2 Y PCNA, ES SUFICIENTE PARA EL ESTUDIO DE ESTOS PROCESOS A PESAR DE NO DISPONER DE MATERIAL CONGELADO. LAS VARIABLES CON VALOR PRONOSTICO SON: LA LOCALIZACION DE LESIONES EN EXTREMIDADES, LA VSG, LA HEMOGLOBINA, LA LDH, EL GRADO DE MALIGNIDAD DE LA WORKING FORMULATION Y LA EXPRESION DEL ANTIGENO PCNA.