GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: LIQUEN PLANO Y SU RELACIÓN CON EL VIRUS DE LA HEPATITIS C: ESTUDIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO

Autor: GIMENEZ GARCÍA ROSA M.

Universidad: VALLADOLID

Departamento: MEDICINA

Fecha de lectura: 19/07/2001

Direccion:

PÉREZ CASTRILLÓN JOSE LUIS (director)

Tribunal:

HERREROS FERNÁNDEZ VICENTE (presidente)
TORIBIO PÉREZ JAIME (vocal)
MARTÍN PASCUAL AGUSTÍN (vocal)
MORAN ESTEFANIA MANUEL (vocal)
MIRANDA ROMERO ALBERTO (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
EPIDEMIOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA
MEDICINA INTERNA

Resumen:

Se estudiaron las características clínicas y epidemiológicas en 101 pacientes diagnosticados de liquen plano, entre Enero de 1992 y Diciembre del 2000, en una consulta de Dermatología del Hospital del Rio Hortega donde se atienden pacientes de medio urbano y rural pertenecientes al área sanitaria oeste de Valladolid. Determinamos una edad media de 48 años y una afectación discretamente superior en mujeres 56,4%. Las localizaciones más frecuentes de liquen plano fueron la cavidad oral 52%, muñecas 40%, pies 27% y espalda 17%.La duración media de las lesiones fue de 21 meses. Existía un antecedente familiar de diabetes mellitus en un 29,7% de los casos y de liquen plano en 1,9%.Las formas clínicas más comunes resultaron liquen ruber plano 54,4%, liquen plano oral 12,8%, liquen erosivo 5,9%, liquen plano pilaris 5,9%,liquen plano lineal 5,9%,liquen plano anular 4,9%, alopecia frontal fibrosante 1,9%, y liquen plano hipertrófico 1,9%.La prevalencia de anticuerpos anti virus de hepatitis C fue de un 8,9% (9 casos) frente a 2,02% en el grupo control (tomado de pacientes atendidos en la misma consulta y emparejados por edad y sexo, por otras dermatosis) lo que supuso una asociación estadísticamente signficativa (OR 1,74). En toros 9 casos existía otra hepatopatía asociada. En 17 casos se encontraron anticuerpos anti Hbs y anti Hbc positivos y en el caso Hbs Ag positivo. Constatamos la asociación a diversas enfermedades sistématicas como depresión (8 caos), acontecimiento estresante agudo 25, alergia 15, enfermedad tiroidea 11, hipertensión arterial 11, Síndrome de Grinspan 3, diabetes mellitus 10, hipertriliceridemia 6, neoplasias 3, cardipatía 9, tuberculosis 1,

ulcus gastroduadenal 4, trombopenia 4 y esclerosis múltiple 1. Además se asociaron las siguientes enfermedades dermatológicas: urticaria 5, alopecia areata 3, psoriasis 3, dermatitis atópica 2, millia 3, dermatitis seborreica 2 y poroqueratosis 1.

El 29% de