

Título: LOS NEVOS MELANOCÍTICOS ADQUIRIDOS INTRADÉRMICOS: NEVO DE UNNA Y NEVO DE MIESCHER

Autor: CERRO HEREDERO MARTA DEL

Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID

Departamento: MEDICINA II DERMATOLOGIA

Fecha de lectura: 20/03/2002

Dirección:

SÁNCHEZ YUS EVARISTO (director)

Tribunal:

GARCÍA PÉREZ ANTONIO (presidente)

REQUEMA CABALLERO LUIS (vocal)

CONTRERAS RUBIO FÉLIX (vocal)

FRAGA FERNÁNDEZ JAVIER (vocal)

COCA MENCHERO SANTIAGO (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS DE LA NUTRICION

CIENCIAS MEDICAS

Localización: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID ARCHIVO GENERAL - PABELLÓN DE GOBIERNO
ISAAC PERAL, S/N 28040 MADRID

Resumen:

Los nuevos melanocíticos adquiridos (NMAqs) se han clasificado tradicionalmente en junturales, compuestos e intradérmicos (NMIDs). En 1990 Ackerman y Magaña-García publicaron el artículo Naming acquired melanocytic nevi. Unna's, Miescher's, Spitz's, Clark's en el que describieron cuatro tipos de NMAqs denominándolos con el nombre del autor que primero los describió o popularizó; dividieron los NMIDs en dos tipos: nevo de Unna (Nun) y nevo de Miescher (NMi).

Hemos revisado 751 NMAqs completamente extirpados (excluyendo los de palmas, plantas y genitales): 458 intradérmicos (234 NsU(n) y 224 NsMi), 263 junturales y compuestos, 13 nevos de Spitz y 17 nevos de Reed. Posteriormente nos hemos centrado sólo en los NMIDs, analizando su arquitectura, localización y características histológicas.

RESULTADOS

En el Nun las células névicas están confinadas a la dermis adventicial; en el NMi ocupan tanto la dermis adventicial como la reticular.

Casi todos los NsMi se localizan en la cara (203/224); casi todos los NMIDs de la cara son NsMi (203/212); casi todos los NMIDs de cuello (33/37), tronco (158/160) y extremidades (15/18) son NsUn; en el cuero cabelludo la incidencia de Nun (19/31) y NMi (12/31) es más parecida.

El NMi tiene significativamente ($p=0,000$) más: folículos pilosebáceos, folliculitis subnévica, maduración desordenada, nevocitos multinucleados, melanocitos basales grandes, crestas epidérmicas, banda dérmica superficial libre, lipomitazación. El Nun tiene significativamente ($p=0,000$) más: maduración en profundidad, nidos junturales epidérmicos, nidos radiales,

espacios pseudovasculares tapizados por células névicas.

CONCLUSIONES

* Todos los NMIDs pueden clasificarse en dos subgrupos con caracteres arquitecturales contrapuestos.

* Se puede establecer una relación entre el patrón arquitectural del NMID y su localización (salvo en el cuero cabelludo) de modo que casi todos los NMIDs de la c