GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: MANIFESTACIONES CUTANEAS EN PACIENTES EN HEMODIALISIS PERIODICA POR INSUFICIENCIA RENAL CRONICA

Autor: TERCEDOR SANCHEZ JESUS

Universidad: GRANADA

Fecha de lectura: 01/01/1992

Tribunal:

CAMACHO MARTINEZ FRANCISCO	(presidente)
ANEIROS CACHAZA JOSE FRANCISCO	(vocal)
ORTEGA DEL OLMO ROSA MARIA	(vocal)
FERNANDEZ VOZMEDIANO JOSE MANUEL	(vocal)
MANJON GARCIA MANUEL	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS

CIENCIAS MEDICAS

DERMATOLOGIA

MEDICINA INTERNA

NEFROLOGIA

Resumen:

SE HA REALIZADO UN ESTUDIO TRANSVERSAL CON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 1. CONOCER LAS ENFERMEDADES CUTANEAS QUE PADECEN LOS PACIENTES EN HEMODIALISIS PERIODICA POR INSUFICIENCIA RENAL CRONICA.

2. CONOCER LOS FACTORES QUE MOTIVAN ESTAS ENFERMEDADES, PARA LO QUE SE HA REALIZADO UN ANALISIS ESTADISTICO PARA EVALUAR LAS RELACIONES ENTRE LOS PARAMETROS CLINICOS, DE LABORATORIO Y OTROS PROPIOS DE LA TECNICA DE DIALISIS.

DESPUES DE COMPLETAR EL ESTUDIO EN LOS 114 ENFERMOS QUE SE CONTROLAN EN EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRANADA SE HA LLEGADO A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES: 1. LOS PACIENTES EN HEMODIALISIS PERIODICA POR INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PRESENTAN UNA ALTA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES CUTANEAS. 2. LAS MANIFESTACIONES CUTANEAS SON INDEPENDIENTES DEL TIPO DE MEMBRANA UTILIZADO EN LAS HEMODIALISIS. 3. EL PRURITO ES MUY FRECUENTE. SU ORIGEN ES MULTIFACTORIAL, ESTANDO IMPLICADOS EN NUESTRA SERIE LA HIPERMAGNESEMIA Y LA XEROSIS. 4. LA XEROSIS, EN INTIMA RELACION CON EL PRURITO, SE RELACIONA CON DEFICIT HIDROLIPIDICOS DE LA SUPERFICIE CUTANEA Y CON LA HIPOPROTEINEMIA. 5. LAS ONICOPATIAS SON MUY FRECUENTES. LA AUSENCIA DE LUNULA NO

SE RELACIONA CON LA ANEMIA Y LAS UÑAS MITAD Y MITAD APARECEN EN LOS PACIENTES MAS DETERIORADOS. 6. EL ENVEJECIMIENTO CUTANEO PRECOZ ES UNA REALIDAD, ESTANDO EN NUESTRA SERIE, REPRESENTADO POR LA ALTA FRECUENCIA DE PRECANCER Y CANCER CUTANEO, PURPURA DE BATEMAN Y ARRUGAS.

7. LA DERMATOSIS AMPOLLOSA ASOCIADA A HEMODIALISIS Y LA DERMATOSIS PERFORANTE ADQUIRIDA, AUNQUE BASTANTE CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES EN HEMODIALISIS PERIODICA POR INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, SON POCO FRECUENTES EN NUESTRA SERIE.