GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: NEVUS MELANOCITICOS EN DIFERENTES GRUPOS DE EDAD (ESTUDIO EN 1039

Autor: LOZANO GUADALAJARA PILAR

Universidad: MURCIA

Departamento: BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR "B" E INMUNOLOGIA

Fecha de lectura: 01/01/1999

Direccion:

VICENTE ORTEGA VICENTE (director)
SANCHEZ PEDREÑO GUILLEN (codirector)

Tribunal:

LOZANO TERUEL JOSE ANTONIO (presidente)
MORENO GIMENEZ JOSE CARLOS (vocal)
RODRIGUEZ PICHARDO ANTONIO (vocal)
GOMEZ ZAPATA MAXIMILIANO (vocal)
HERNANDEZ-GIL BORDALLO ANTONIO (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
EPIDEMIOLOGIA
ONCOLOGIA
PATOLOGIA

Resumen:

Ante el consenso internacional de que la lucha más eficaz contra el Melanoma Cutáneo es la identificación de las lesiones precursoras: Nevus atípicos y Nevus congénitos; esta tesis plantea tres objetivos:

1. Conocer la frecuencia de los nevus melanocíticos en diversos grupos de edad en la Comunidad de Murcia, las características clínicas y su relación con otras variables personales.

2. Determinar la frecuencia de los nevus atípicos y establecer su relación con los hábitos solares y características personales.

3. Estudiar histopatológicamente aquellos nevus extirpados.

Para ello se estudiaron 1039 individuos procedentes de distintos centros docentes, sociales y de las consultas de Dermatología y Anatomía Patológica del Hospital General Universitario, Hospital Virgen de la Arrixaca y Hospital Los Arcos, desde Enero de 1997 a Mayo de 1998. Siguiendo los protocolos que han

utilizado investigadores de países pioneros en la prevención del Melanoma Cutáneo se estableció un cuestionario retrospectivo en el que se recogía datos personales, familiares y antecedentes de exposición solar; así como un protocolo clínico que reunía los datos de la exploración clínica.

En los casos en que se realizó el estudio anatomo-patológico las muestras siguieron los protocolos habituales. El estudio estadístico consistió en la determinación de las medidas de centralización y de dispersión, el cálculo de los coeficientes de correlación lineal entre pares de variables, el análisis de varianza y test de la T-student y el análisis de las tablas de contingencia chi-cuadrado de Pearson.

Los resultados se dividieron en tres grupos:

1. Descripción de las características generales de los individuos estudiados.

2. Datos clínico-patológicos más relevantes de los nevus observados.

3. Relaciones estadísticamente representativas entre las distintas variables consideradas.

Las conclusiones obtenidas a par