GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: NEVUS SEBACEO DE JADASSOHN.

Autor: JAQUETI PEINADO GERARDO
Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID

Fecha de lectura: 01/01/1998

Direccion:

SANCHEZ YUS EVARISTO (director)

Tribunal:

GARCIA PEREZ ANTONIO (presidente)
CALAP CALATAYUD JOAQUIN (vocal)
GARCIA DIEZ AMARO (vocal)
REQUENA CABALLERO LUIS (vocal)
SANCHEZ DE PAZ FRANCISCO (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA

Resumen:

Descrito por primera vez por este autor en 1885; se trata de una lesión congénita, en forma de placa, localizada practicamente siempre en extremidad cefálica, de color amarillento anaranjado, superficie lisa y untosa que con la edad se hace mamelonada, e incluso ulcerada. Cuando la lesión se localiza en cuero cabelludo, deja una placa alopécica.

También se ha descrito una forma neurocutánea, así como algunos casos familiares. Histopatológicamente se caracteriza por ser un hamartoma que afecta a todas las estructuras de la unidad pilo-sebáceo-apocrina, así como a la epidermis, pudiendo distinguirse un componente epidermico, un componente sebáceo, un componente apocrino, y un componente folicular. Pero la mayor importancia de este hamartoma es su capacidad para asociarse con neoplasias, por lo que hasta ahora se recomendaba su extirpación lo antes posible.

Hasta la fecha se han publicado numerosos casos de Nevus Sebáceo de Jadassohn, pero casi siempre por su asociación con alguna neoplasia. Tan solo se encuentran en la literatura cuatro trabajos que recopilen al menos cien casos, y que estudien tanto los cambios clinico-patologicos, como la asociación del hamartoma con neoplasias. Estos son: Mehregan-Pinkus, 150 casos (1965), Wilson Jones-Heyl, 140 casos (1970), Alessi-Sala, 104 casos (1986), y Steffen-Ackerman, 100 casos (1996).

En nuestra serie recopilamos 155 casos de Nevus Sebáceo,

mediante estudio multicéntrico, con especial atención a los cambios histopatológicos en relación con la edad de los pacientes, así como a la asociación de este con neoplasias, que en todas las ocasiones fueron de caracter benigno. Se hace un estudio comparativo con los hallazgos de las otras grandes series, así como un estudio comparativo específico iconográfico con respecto a las publicaciones previas de neoplasias asociadas a nevus sebáceo que aportaron iconografía.