GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: PANICULITIS: CORRELACION CLINICOPATOLOGICA Y EXPERIMENTAL.

Autor: THEIS SANCHEZ ESTHER GRISEL

Universidad: LA LAGUNA

Departamento: MEDICINA INTERNA, DERMATOLOGIA Y PSIQUIATRIA

Fecha de lectura: 01/01/1999

Direccion:

DIAZ FLORES FEO LUCIO	(director)
GARCIA BUSTINDUY MARTA C.	(codirector)

Tribunal:

GARCIA MONTELONGO RAFAEL	(presidente)
HERNANDEZ HERNANDEZ BUENAVENTURA	(vocal)
DOMINGUEZ SILVA JESUS	(vocal)
VARELA ANSEDES HILDA	(vocal)
SANCHEZ GONZALEZ ROSALBA	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS

CIENCIAS MEDICAS

DERMATOLOGIA

HISTOPATOLOGIA

PATOLOGIA

Resumen:

Se estudia la clínica y la anatomía patológica de 133 casos de paniculitis analizándose las clasificaciones propuestas por diferentes autores y las entidades englobadas en cada una y los criterios usados, llegándose finalmente a aceptar como más útil agruparlas en septales, lobulares y mixtas y en cada caso abrir un grupo de paniculitis no específicas para las inclasificables y en cada una sus subgrupos histológicos. Se analizan la edad, sexo localización y tamaño de las lesiones. Se valoran los parámetros histológicos que permiten el diagnóstico de cada una de las entidades estudiadas.

Se estudia un modelo experimental, la inyección de glicerol, como productor a corto plazo, de fenómenos paniculíticos y necrobióticos similares a los hallados en patología humana. Se demuestra que la adipogénesis secundaria se

origina alrededor de los pequeños vasos
lo cual concuerda con la hipótesis
de que los adipocitos postnatales se
originan a partir de células fibroblásticas
y pericitarias.