GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: PATOLOGIA DERMATOLOGICA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO: ESTUDIO MEDIANTE HIBRIDACION IN SITU DE LOS TIPOS 6/11, 16/18 Y 31/33/51.

Autor: ANDREU NAVARRO FRANCISCO JAVIER

Universidad: AUTÓNOMA DE BARCELONA

Fecha de lectura: 01/01/1993

Direccion:

ARIZA FERNANDEZ AURELIO (director)

Tribunal:

NAVAS PALACIOS JOSE JERONIMO (presidente)
FERRANDO BARBERA JUAN (vocal)
SIRVENT CALVERA JUAN JOSE (vocal)
CONDOM MUNDO ENRIC (vocal)
RIBERA PIBERNAT MIGUEL (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
HISTOPATOLOGIA
PATOLOGIA

Resumen:

OBJETIVO DEL ESTUDIO: 1) VALORACION DE LA DISTINTA EXPRESIVIDAD CLINICA DE LOS CONDILOMAS ACUMINADOS EN PACIENTES AFECTOS Y NO AFECTOS DE SIDA, EN RELACION A LA INFECCION POR VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH), 2) VALORACION DE LA POSIBLE PARTICIPACION DEL VPH EN LA ENFERMEDAD DE BOWEN EXTRAGENITAL, 3) DETERMINACION DE LA POSIBLE PARTICIPACION DEL VPH EN LA PAPULOSIS BOWENOIDE Y PREVALENCIA DEL TIPO DE VPH IMPLICADO, 4) DETERMINACION DE LA POSIBLE PARTICIPACION DEL VPH EN CARCINOMAS ESCAMOSOS DE PENE Y VULVA. COMPARACION CON EL CARCINOMA ESCAMOSO DE PIEL DE LOCALIZACION EXTRAGENITAL, Y 5) DETERMINACION DE LA POSIBLE PARTICIPACION DEL VPH EN LA LEUCOPLASIA VELLOSA.

MATERIAL Y METODOS: ESTUDIO RETROSPECTIVO DESCRIPTIVO DE 10 CASOS DE CONDILOMA ACUMINADO EN PACIENTES AFECTOS DE SIDA, 10 CASOS DE CONDILOMA ACUMINADO EN PACIENTES SIN PATOLOGIA INMUNODEPRESORA DE BASE, 20 CASOS DE ENFERMEDAD DE BOWEN DE LOCALIZACION EXTRAGENITAL, 10 CASOS DE PAPULOSIS BOWENOIDE, 10 CASOS DE CARCINOMA ESCAMOSO DE PIEL DE LOCALIZACION EXTRAGENITAL, 5 CASOS DE CARCINOMA ESCAMOSO INFILTRANTE DE VULVA, 5 CASOS DE CARCINOMA ESCAMOSO INFILTRANTE DE PENE Y 13 CASOS DE LEUCOPLASIA VELLOSA.

UTILIZACION DE SECCIONES DE MATERIAL INCLUIDO EN PARAFINA. VALORACION DE CRITERIOS HISTOPATOLOGICOS CONVENCIONALES, PRACTICA DE HIBRIDACION IN SITU CON SONDAS BIOTINILADAS DNA:DNA DE LOS VPH TIPO 6/11, 16/18 Y 31/33/51 Y PRACTICA DE INMUNOHISTOQUIMICA CON ANTICUERPO POLICLONAL ANTI-VPH:

RESULTADOS: 1) HIBRIDACION POSITIVA EN EL 100% DE CASOS DE CONDILOMA ACUMINADO EN PACIENTES CON SIDA PARA EL VPH 6/11 (PRESENCIA DE POSITIVIDAD FOCAL PARA EN VPH 16/18 EN UN 10% DE CASOS Y PARA EL VPH 31/33/51 EN EL 50%). 2) HIBRIDACION POSITIVA EN EL 90% DE CASOS DE CONDILOMA ACUMINADO EN PACIENTES NO SIDA PARA EL VPH 6/11 (AUSENCIA DE POSITIVIDAD PARA EL VPH 16/18 NI 31/33/51). 3) HIBRIDACION POSITIVA EN EL 50% DE CASOS DE PAPULOSIS BOWENOIDE (FUNDAMENTALMENTE PARA EL VPH 16/18) CON NEG