

TESIS DOCTORALES BASE DE DATOS TESEO

Título: PENFIGOS. EVALUACION CLINICA Y TERAPEUTICA.

Autor: PEREZ BERNAL ANA M.

Universidad: SEVILLA

Fecha de lectura: 01/01/1988

Tribunal:

GARCIA PEREZ ANTONIO (presidente)

SOTILLO GAGO ISMAEL (vocal)

CHAPARRO HEREDIA ANTONIO (vocal)

ORTEGA DEL OLMO ROSA (vocal)

ORTEGA RESINAS MIGUEL (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS CIENCIAS MEDICAS DERMATOLOGIA

Resumen:

EL PENFIGO ES UNA DERMATOSIS AUTOINMUNE DE CAUSA DESCONOCIDA Y EXTREMADA GRAVEDAD. POR SU BAJA PREVALENCIA CRONICIDAD Y FALTA DE TRATAMIENTO ETIOLOGICO SU TERAPIA RESULTA DIFICIL TODA VEZ QUE SON LOS CORTICOIDES SISTEMICOS A DOSIS MUY ELEVADAS EL UNICO RECURSO TERAPEUTICO EFICAZ EN EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD.

LOS OBJETIVOS DE ESTA TESIS FUERON: 1)

EFECTUAR UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE 10 AÑOS DE 34

ENFERMOS DE PENFIGO VALORANDO DE FORMA CRITICA SUS

INCIDENCIAS EVOLUTIVAS Y ANALIZANDO LAS CAUSAS MAS

INFLUYENTES EN SU SITUACION FINAL Y 2) VALORAR LA

EFICACIA DE UNA PAUTA PROPIA DE TRATAMIENTO QUE CONTEMPLA

LA UTILIZACION DE DOSIS INICIALES DE PREDNISONA ENTRE 100

Y 275 MG-DIA SEGUN GRAVEDAD DESCENDIENDO PAULATINAMENTE

ESTA CANTIDAD Y AÑADIENDO 100-150 MG DE AZATHIOPRINA.

AL FINAL DEL ESTUDIO HABIA 10
PACIENTES EN ALTA (29 5 %) 11 SIN LESIONES (32 3 %) EN
FASE PREVIA A LA RETIRADA DEFINITIVA DEL TRATAMIENTO LO
QUE OFRECE UNOS RESULTADOS FAVORABLES DEL 61 9 %. SEIS
ENFERMOS (17 6 %) MANTENIAN AUN ELEMENTOS ACTIVOS Y
ESTABAN EN TRATAMIENTO Y 7 (20 5 %) FALLECIERON POR LA
ENFERMEDAD O SU TERAPIA. ESTOS ULTIMOS GRUPOS REPRESENTAN
UNOS RESULTADOS DESFAVORABLES DEL 38 1 %. NUESTROS
RESULTADOS SON VENTAJOSOS EN RELACION A OTRASCASUISTICAS
TENIENDO EN CUENTA LA ELEVADA PROPORCION DE CASOS GRAVES
EN NUESTRASERIE.

DEMOSTRARON SER FACTORES RELACIONADOS CON LA MUERTE EN EL PENFIGO: GRAVEDAD INICIAL QUE REQUIRIO DOSIS ENTRE 200 Y 275 MG-DIA DE PREDNISONA INFECCION CUTANEO-MUCOSA

INICIAL HIPOALBUMINEMIA Y PERDIDA DE PESO ANTES DEL COMIENZO DELTRATAMIENTO PRESENTACION DE MAS DE TRES RECIDIVAS EN TOTAL Y DESCONTROL EN FASEDE MANTENIMIENTO.

CONCLUIMOS QUE EL PENFIGO ES UNA GRAVE ENFERMEDAD QUE HA
DE SER DIAGNOSTICADA Y TRATADA CUANTO ANTES CON DOSIS
SIEMPRE ELEVADAS DE PREDNISONA CON ARREGLO A SU
INTENSIDAD QUE HAN DE SER MANTENIDAS EL TIEMPO
SUFICIENTE PARA QUE SEAN EFECTIVAS LO QUE DETERMINA EL
MEJOR CONTROL FUTURO DEL PACI