GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: PSORIASIS: CONTRIBUCION A SU ESTUDIO HISTOQUIMICO CUANTITATIVO

Autor: GONZALEZ RODRIGUEZ SALVADOR
Universidad: MÁLAGA

Fecha de lectura: 01/01/1990

Tribunal:

VAAMONDE LEMOS RICARDO	(presidente)
BOSCH GARCIA RICARDO	(vocal)
VILLENA GARCIA-CABRERA ALICIA	(vocal)
PEÑA AMARO JOSE	(vocal)
REQUENA GALLEGO VIRGINIA	(secretario)

Descriptores:

BIOLOGIA HUMANA
CIENCIAS DE LA VIDA
HISTOLOGIA HUMANA

Resumen:

EL PSORIASIS ES UNA DERMATOSIS INFLAMATORIA PROTOTIPO DE LOS PROCESOS PROLIFERATIVOS CUTANEOS BENIGNOS, EN LOS QUE SE HA PRESTADO ESPECIAL ATENCION A LA CINETICA DE LA PROLIFERACION CELULAR EPIDERMICA, POR SER LA HIPERPLASIA EPIDERMICA EL COMPONENTE FISIOPATOLOGICO PRINCIPAL DE LA ENFERMEDAD. EN ESTE TRABAJO DE INVESTIGACION SE UTILIZARON 6 MUESTRAS DE PIEL HUMANA DE SUJETOS SANOS Y 52 MUESTRAS DE PACIENTES PSORIASICOS, LA MITAD DE PIEL IMPLICADA EN LA LESION Y LA OTRA MITAD DE PIEL NO IMPLICADA EN LA MISMA. SE HA REALIZADO EN PRIMER LUGAR UN ESTUDIO HISTOQUIMICO-CUANTITATIVO DEL CONTENIDO TOTAL EN ADN DE LOS QUERATINOCITOS BASALES, SUPRABASALES Y ESPINOSOS EN LA PIEL NORMAL, Y DE LOS QUERATINOCITOS DEL COMPARTIMENTO GERMINATIVO EN LA PIEL PSORIASICA. DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE TIPIFICARON LOS PACIENTES EN 3 GRUPOS SEGUN EL CONTENIDO TOTAL EN ADN DE LOS QUERATINOCITOS BASALES Y SUPRABASALES. EN EL GRUPO I SE INCLUYERON LOS QUE PRESENTARON UN PERFIL MONOMODAL DIPLOIDE, EN EL GRUPO II LOS DE UN PERFIL BIMODAL Y EN EL GRUPO III LOS DE PERFIL TETRAPLOIDE Y/O ANEUPLOIDE. POR OTRA PARTE, SE VALORO LA RELACION EXISTENTE ENTRE LOS DISTINTOS GRUPOS ESTABLECIDOS Y CIERTAS VARIABLES CLINICAS (EDAD, SEXO, FENOMENO DE KOEBNER, ETC.) OBSERVANDOSE DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS RESPECTO AL TIEMPO DE EVOLUCION DEL BROTE EN ESTUDIO Y A LA RESPUESTA AL EFECTO KOEBNER. FINALMENTE SE REALIZO UN ESTUDIO ESTEREOLOGICO DETERMINANDOSE EL NUMERO DE QUERATINOCITOS POR UNIDAD DE AREA EPIDERMICA EN LOS TRES TIPOS DE PIEL, ASI COMO LA RELACION EXISTENTE ENTRE EL NUMERO DE QUERATINOCITOS BASALES Y TOTALES, OBSERVANDO UN INCREMENTO DE LA POBLACION CELULAR DE LOS SUJETOS NORMALES A LOS PACIENTES PSORIASICOS.