

TESIS DOCTORALES BASE DE DATOS TESEO

TÍTUIO: TELETERMOGRAFIA EN EL DIAGNOSTICO Y EVOLUCION DEL MELANOMA MALIGNO.

Autor: SERRANO ORTEGA SALVIO

Universidad: GRANADA

Fecha de lectura: 01/01/1979

Direccion:

DULANTO ESCOFET FELIPE (director)

Tribunal:

DULANTO ESCOFET FELIPE DE (presidente)

DE LA HIGUERA ROJAS JOSE (vocal)
DIAZ-FLORES FEO LUCIO (vocal)
MORA LARA JOSE (vocal)

SANCHEZ MUROS JOSE (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS CIENCIAS MEDICAS DERMATOLOGIA

Resumen:

LA TERMOGRAFIA(TH) ES UN MEDIO UTIL E INOCUO EN EL DIAGNOSTICO Y VIGILANCIA POSTERAPEUTICA DEL MELANOMA MALIGNO. NUESTRO ESTUDIO SE EFECTUO EN 164 ENFERMOS.

PROPONEMOS MODIFICACIONES A LA CLASIFICACION TH DE SPITALIER-AMALRIC QUE AMPLIA SUS POSIBILIDADES. LA CATEGORIA TH DE UN MELANOMA DEPENDE DE SUS CARACTERES DE MALIGNIDAD. LA HIPERTERMIA ESTA EN RELACION DIRECTA CON EL NIVEL DE CLARK. ES INDEPENDIENTE DE CITOLOGIA PIGMENTACION Y EDAD DEL ENFERMO. INFLUYEN LA FORMA CLINICA TAMAÑO ESTADO DE ANDERSON. DEMUESTRA METASTASIS CUTANEAS Y GANGLIONARES EN EL 100%. EN MENOR PROPORCION OSEAS HEPATICAS Y MAMARIAS. NO REVELO PULMONARES. LA VIGILANCIA DE INJERTOS Y CICATRICES CONSECUENCIA DE EXTIRPACION PERMITE PREVER RECIDIVAS LOCALES Y METASTASIS. LOS INJERTOS SE ENFRIAN A MEDIDA QUE IGUALAN EN SUPERFICIE LA PIEL CIRCUNDANTE DANDO IMAGENES EN ESCARAPELA. LAS CICATRICES DE EXCISION Y CIERRE DIRECTO SE ENFRIAN AL MES; LAS DE COLGAJOS LOCALES MAS DESPACIO.

LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN NEVUS PIGMENTOCELULARES EPITELIMAS BASOCELULARES Y ANGIOMA TROMBOSADO COINCIDEN CON LA BIBLIOGRAFIA. EN MELANOMA JUVENIL VERRUGAS SEBORREICAS Y NEVUS AZUL NO APARECIERON TERMOGRAMAS MALIGNOS. LA TH DEL BOTRIOMICOMA DEPENDE DE SU SUPERFICIE Y EVOLUCION. EL ACANTOMA DE CELULAS CLARAS ES FRIO.