GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Título: URTICARIA CRONICA IDIOPATICA. INCIDENCIA DE VASCULITIS LEUCOCITOCLASTICA Y CATALOGACION DE PATRONES HISTOPATOLOGICOS.

Autor: PETEIRO GARCIA CARMEN

Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA

Fecha de lectura: 01/01/1987

Tribunal:

MARTIN PASCUAL AGUSTIN	(presidente)
FORTEZA VILA JERONIMO	(vocal)
PEREZ OLIVA NARCISO	(vocal)
LORENZO ZUÑIGA VICENTE	(vocal)
BEIRAS IGLESIAS ANDRES	(secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
HISTOPATOLOGIA
PATOLOGIA

Resumen:

SE ESTUDIAN 95 PACIENTES CON URTICARIA CRONICA IDIOPATICA QUE SON SOMETIDOS A UN PROTOCOLO CLINICO Y PATOLOGICO, SIENDO EL PROPOSITO FUNDAMENTAL DEL TRABAJO LA INVESTIGACION DE LA INCIDENCIA DE VASCULITIS LEUCOCITOCLASTICA Y LA CATALOGACION DE LOS POSIBLES CUADROS REACCIONALES EXISTENTES EN LA URTICARIA CRONICA IDIOPATICA.VASCULITIS LEUCOCITOCLASTICA DEFINIDA POR LA PRESENCIA DE INFILTRACION VASCULAR Y PERIVASCULAR PREDOMINANTEMENTE NEUTROFILICA Y LEUCOCITOCLASIA BIEN MANIFIESTA, SE ENCUENTRA EN 12 PACIENTES, REPRESENTANDO EL 12,63% DE LA TOTALIDAD DE CASOS.EN EL GRUPO MAYORITARIO, NO VASCULITICO, EXISTEN LOS HECHOS CLASICOS DE LA URTICARIA, EDEMA DEL COLAGENO, VASODILATACION E INFILTRADO CELULAR POR LINFOCITOS, NEUTROFILOS Y EOSINOFILOS. SIN EMBARGO, EL PREDOMINIO DE UN TIPO CELULAR SOBRE LOS OTROS PERMITE DIFERENCIAR DIVERSOS SUBGRUPOS FACILMENTE RECONOCIBLES Y QUE SON LOS SIGUIENTES:

URTICARIA NO VASCULITICA DE PREDOMINIO EOSINOFILICO (UNVE): SE ENCUENTRA EN 5 PACIENTES QUE REPRESENTAN EL 6,02% DE LAS FORMAS NO VASCULITICAS.

URTICARIA NO VASCULITICA DE PREDOMINIO NEUTROFILICO (UNVN): REPRESENTA EL 7,22%.

URTICARIA NO VASCULITICA DE PREDOMINIO LINFOCITICO

(UNVL): FUE VISTA EN 34 CASOS, ES DECIR EN EL 40,96%.

URTICARIA NO VASCULITICA SIN PREDOMINIO DE NINGUN TIPO CELULAR (UNVM): SE ENCONTRO EN 38 CASOS, QUE REPRESENTA EL 45,78%.

LA INMUNOPATOLOGIA POR LA TECNICA DEL PAP DE 25 CASOS ES POSITIVA PARA INMUNOGLOBULINAS Y/O COMPLEMENTO EN 9, DE LOS CUALES 5 SON FORMAS VASCULITICAS Y LAS RESTANTES DEL TIPO NO VASCULITICO (UNV) DE INFILTRADO DENSO.

EN NINGUN GRUPO O SUBGRUPO HISTOLOGICO SE ENCONTRO CORRELACION CON DATOS CLINICOS NI ANALITICOS.