GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: URTICARIA CRONICA IDIOPATICA: PATRONES DE URTICARIA NO VASCULITICA.

Autor: ZULAICA GARATE ANDER
Universidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA

Fecha de lectura: 01/01/1996

Direccion:

TORIBIO PEREZ JAIME (director)

Tribunal:

PEREZ OLIVA NARCISO (presidente)
MIRANDA ROMERO ALBERTO (vocal)
CRUCES PRADO MANUEL (vocal)
PEREIRO FERREIROS MERCEDES (vocal)
FERNANDEZ REDONDO P. VIRGINIA (secretario)

Descriptores:

ALERGIAS
CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
PATOLOGIA

Resumen:

SE HAN ESTUDIADO 228 PACIENTES CON URTICARIA CRONICA IDIOPATICA, EN SUS ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS, CLINICOS Y ANALITICOS, REALIZANDO ADEMAS UNA CATALOGACION HISTOPATOLOGICA DEL INFILTRADO PRESENTE EN EL HABON.SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE DOS GRANDES GRUPOS DESDE EL PUNTO DE VISTA HISTOPATOLOGICO UNO CON PRESENCIA DE VASCULITIS LEUCOCITOCLASTICA -UVL- Y OTRO NO VASCULITICO -UNV-, SIENDO ESTE ULTIMO EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE ESTUDIO. DENTRO DE LAS UNV SE PUEDEN DIFERENCIAR, TRAS CUANTIFICACION DEL INFILTRADO, DIFERENTES TIPOS HISTOPATOLOGICOS EN FUNCION DE SU PREDOMINIO CELULAR:

URTICARIA NO VASCULITICA EOSINOFILICA -UNVE-, URTICARIA NO VASCULITICA LINFOCITICA -UNVL-, URTICARIA NO VASCULITICA NEUTROFILICA -UNVN-, Y URTICARIA NO VASCULITICA MIXTA -UNVM-.

EL ESTUDIO ESTADISTICO DE ESTOS PATRONES NO DEMUESTRAN CORRELACION CON NINGUNO DE LOS PARAMETROS CLINICOS O ANALITICOS ESTUDIADOS. SE HAN COMPARADO ESTOS DATOS CON LOS ENCONTRADOS EN ESTUDIOS PREVIOS DE NUESTRO GRUPO DE TRABAJO, VALORANDO ADEMAS LA UTILIDAD DE LA CLASIFICACION CUANTITATIVA Y NO CUANTITATIVA DEL INFILTRADO, CONCLUYENDO QUE SE OBTIENEN RESULTADOS ESTADISTICAMENTE SIMILARES.