GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: UTILIDAD DE LA CITOLOGIA POR PUNCION ASPIRACION EN DERMATOPATOLOGIA.

Autor: GARCIA ROJO BLAS

Universidad: MURCIA

Departamento: OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA Y ANATOMIA PATOLOGICA

Fecha de lectura: 01/01/2000

Direccion:

PEREZ GUILLERMO GARCIA MIGUEL (director)
VICENTE ORTEGA VICENTE (codirector)

Tribunal:

GONZALEZ CAMPORA RICARDO (presidente)
MARTINEZ PARRA DIEGO (vocal)
SANCHEZ-PEDREÑO GUILLEN (vocal)
HERNANDEZ-GIL BORDALLO ANTONIO (vocal)
PASTOR QUIRANTE FRANCISCO (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
PATOLOGIA

Resumen:

Los objetivos del estudio son: 1. Determinar el valor de la Citología, en especial la obtenida por punción-aspiración con aguja fina, en el estudio y diagnóstico de distintos tipos de lesiones cutáneas. 2. Estudiar las características ultraestructurales de algunas de las lesiones anteriores. 3. Establecer las características ultraestructurales de algunas de las lesiones cutáneas anteriores. Se han estudiado 664 lesiones cutáneas y subcutáneas, que se han clasificado en inflamatorias, tumorales epiteliales, melanocíticas, mesenquimales, neuroendocrinas y metastásicas. Se describen las características citológicas observadas y se comparan con el estudio histopatológicos de las mismas y en algunas lesiones se describen sus características inmunocitoquímicas y ultraestructurales. Las conclusiones a las que se ha llegado en el estudio son: 1. La citología por punción-aspiración puede ser el primer paso en el diagnóstico en la patología tumoral cutánea. Debe ser realizada por el patólogo para garantizar la adecuación de la muestra, quien debe disponer de los datos clínicos pertinentes. Permite, en la mayoría de los casos, discriminar entre benignidad y malignidad. Además, es un técnica sencilla, rápida, económica, capaz de proporcionar un diagnóstico fiable y rápido que permite un mejor manejo clínico del paciente. 2. Permite el diagnóstico

de lesiones inflamatorias agudas, micosis, algunos tipos de enfermedades víricas, como el herpes zóster y el molluscum contagioso, y granulomatosas, en las que puede identificar el agente causal en ciertas ocasiones. Las paniculitis pueden ser diagnosticadas de forma genética. 3. No puede discriminar los diferentes tipos de tumores cutáneos de anejos, salvo el pilomatrixoma. El carcinoma basocelular puede ser diagnosticado con una alta fiabilidad, mientras que los aspirados de células escamosas presentan el problema del diagnóstico diferencial con lesiones ben