

TESIS DOCTORALES BASE DE DATOS TESEO

Título: VALORACION CLINICA DEL TRATAMIENTO CON ETRETINATO (RO 10-9359) Y SU

COMBINACION CON TERAPEUTICAS CONVENCIONALES EN PSORIASIS SEVERAS.

Autor: HOYO GONZALEZ MARINA DEL

Universidad: NAVARRA

Fecha de lectura: 01/01/1988

Tribunal:

VAZQUEZ GARCIA JESUS (presidente)

ARMIJO MORENO MIGUEL (vocal)

CARAPETO MAZQUEZ DE PRADO (vocal)

FRANCISCO JOSE

CENARRUZABEITIA SAGARMINAGA (vocal)

EDURNE

PARDO MINDAN JAVIER (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS CIENCIAS MEDICAS DERMATOLOGIA

Resumen:

SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PROSPECTIVO REN 162 PACIENTES CON PSORIASIS SEVERAS, 14 DE LOS CUALES ASOCIABAN UNA ATROPATIA PSORIASICA. SE VALORO LA UTILIDAD Y SEGURIDAD DEL ETRETINATO TANTO EN MONOTERAPIA COMO COMBINADO CON ANTRALINA, PUVA O METOTREXATE.

EL ETRETINATO FUE EFICAZ EN TODOS LOS TIPOS DE PSORIASIS, ESPECIALMENTE EN LAS FORMAS COMPLICADAS (ERITRODERMICA Y PUSTULOSA). SU ASOCIACION CON ANTRALINA, PUVA O METROTEXATE MEJORA LA RESPUESTA DE CADA TERAPETICA POR SEPARADO, CONSIGUE CONTROLAR PSORIASIS PREVIAMENTE RESISTENTES A LAS MISMAS Y PERMITE LA REDUCCION DE LA DOSIS TOTAL DE ETRETINATO ADMINISTRADA.

AUNQUE EL ETRETINATO PREVIENE LA APARICION DE REBROTES Y ALARGA POR PERIODOS DE REMISION, SU SEGURIDAD A LARGO PLAZO NO ESTA BIEN ESTABLECIDA.

EN EL GRUPO DE ARTROPATIAS PSORIASICAS EL ETRETINATO FUE IGUALMENTE EFECTIVO, MEJORANDO LOS PARAMETROS DE ACTIVIDAD ARTICULAR EN 13 CASOS Y CONSIGUIENDO REMISIONES COMPLETAS EN EL 57% DE LOS MISMOS.

LOS EFECTOS SECUNDARIOS DEL ETRETINATO, AUNQUE NUMEROSOS, SON BIEN TOLERADOS Y DOSIS-DEPENDIENTES. LA QUEILITIS ES LA MANIFESTACION MAS COMUN. LAS ALTERACIONES BIOQUIMICAS MAS FRECUENTES: HIPERTRIGLICERIDEMIA Y ELEVACION DE LAS CIFRAS DE TRANSAMINASAS, CONDICIONARON LA SUSPENSION DE LA DROGA EN 4 PACIENTES. LA

TERATOGENICIDAD DEL ETRETINATO CONTINUA SIENDO SU LIMITACION MAS IMPORTANTE.