GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

TESIS DOCTORALES
BASE DE DATOS TESEO

Título: XANTOGRANULOMAS JUVENILES Y OTRAS HISTIOCITOSIS NO-X. ESTUDIO CLINICO, HISTOLOGICO E INMUNOHISTOQUIMICO.

Autor: RODRIGUEZ SERNA MERCEDES

Universidad: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

Fecha de lectura: 01/01/1995

Direccion:

ALIAGA BONICHE ADOLFO (director)

Tribunal:

JORALA CUEVAS ESPERANZA (presidente)
ALVAREZ ANGEL VICENTE (vocal)
FERRANDO I BARBERA JOAN (vocal)
HERRERO MATEU CARMEN (vocal)
FORTEA BAIXAULI JOSE MIGUEL (secretario)

Descriptores:

CIENCIAS CLINICAS
CIENCIAS MEDICAS
DERMATOLOGIA
INMUNOPATOLOGIA
PATOLOGIA

Resumen:

LAS HISTIOCITOSIS SON UN GRUPO DE ENFERMEDADES CARACTERIZADAS POR LA PROLIFERACION DE CELULAS DERIVADAS DEL SISTEMA MONONUCLEAR FAGOCITICO Y DEL SISTEMA DE CELULAS DENDRITICAS. ACTUALMENTE SE ENCUADRAN EN TRES CLASES: I) HISTIOCITOSIS DE CELULAS DE LANGERHANS, II) HISTIOCITOSIS DE CELULAS DEL SISTEMA MONONUCLEAR-FAGOCITICO SIN INCLUIR LAS CELULAS DE LANGERHANS, Y III) HISTIOCITOSIS MALIGNAS.

EN ESTE TRABAJO SE REALIZA UN ESTUDIO CLINICO, HISTOLOGICO E INMUNOHISTOQUIMICO DE 48 CASOS DE HISTIOCITOSIS INCLUIDAS EN EL GRUPO II.

DE ESTE ESTUDIO SE DESPRENDE QUE NO EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS XANTOGRANULOMAS JUVENILES DE LA EDAD PEDIATRICA Y ADULTA, NI ENTRE LOS XANTOGRANULOMAS JUVENILES, LA HISTIOCITOSIS CEFALICA BENIGNA Y EL HISTIOCIOTOMA EURPTIVO GENERALIZADO. ADEMAS, LAS CELULAS PROLIFERANTES EN EL XGJ EXPRESARON INMUNOFENOTIPO DE DENDROCITO DERMICO Y/O MACOFAGO. EN EL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ENTRE HISTIOCITOSIS X Y NO-X, LA PROTEINA S-100 FUE CAPAZ DE CLASIFICAR CORRECTAMENTE EN SU GRUPO EL 98% DE LOS CASOS, MIENTRAS QUE EL FACTOR XIII A LO HIZO EN EL 88% DE LOS CASOS.