Título: LEISHMANIASIS CUTANEA: EPIDEMIOLOGIA DE LA AXARQUIA MALAGUEÑA. ESTUDIO MORFOLOGICO Y ULTRAESTRUCTURAL.

Nombre: OCAÑA WILHELMI JUAN B.

Universidad: GRANADA

Fecha de lectura: 01/01/1998

Dirección:

> **Director:** JUAN OCAÑA SIERRA

Tribunal:

> **presidente:** GONZALO PIÉDROLA ANGULO

> **secretario:** Vicente Delgado Florencio

> **vocal:** Joaquín Calap Calatayud

> **vocal:** MIGUEL MORELL OCAÑA

> **vocal:** ANTONIO CAMPOS MUÑOZ

Descriptores:

> CIENCIAS MEDICAS

> EPIDEMIOLOGIA

> DERMATOLOGIA

> CIENCIAS CLINICAS

El fichero de tesis no ha sido incorporado al sistema.

Resumen: En la axarquia malagueña la incidencia de leishmaniasis cutánea es 600 veces superior a la media nacional y 400 veces a la media de la provincia de Málaga.

El phlebotomus oérniciosus y el perro vagabundo, son el vector y reservorio habituale respectivamente, de la Leishmania Infantum.

La forma clínica más frecuente de Leishaniasis cutánea es la pápulo-nodular, seguida de la ulcerada, lupoide o diseminada.

El test deleishmanianaevidenció que los niños hasta tres años tienen menor poditividad que los restantes grupos de edad.

El análisis cluster mostró que benamargosa da la mayor positividad, seguida de Triana Periana, Viñuela, Los Romanes, etc.

El diagnóstico clínico y parasitológico, cultivo, histopatología, microscopia electrónica de transmisión y, por vez primera, se obtienen imágenes de calidad de la Leishmania Infantum con microscopia de barrido.